

125mm



410171

“健亞”健膽舒錠100毫克（去氧熊膽酸）

Genurso Tablets 100mg ( Ursodesoxycholic Acid )

G-6266  
衛署藥製字第 042210 號

“健亞”健膽舒錠 50 毫克（去氧熊膽酸）

Genurso Tablets 50 mg ( Ursodesoxycholic Acid )

G-6267  
衛署藥製字第 042211 號

處方成份：

每錠含 Ursodesoxycholic Acid 50mg或100mg。

賦形劑：

Sodium Starch Glycolate、Pregelatinized Corn Starch、Purified Water、Lactose、Magnesium Stearate

作用：

本品具有利膽作用，膽色素排泄機能促進作用，VitB<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>之吸收與酯化促進作用，Vit C在臟器內貯藏增加作用，肝動物澱粉（Glycogen）之生成增加作用，促進消化酵素與消化液之分泌，另亦具有肝血流增加作用，脂肪之吸收促進作用，膽汁之Cholesterol不飽和作用。

適應症：

膽固醇系膽結石之溶解、原發性膽道肝硬化(P<sub>1</sub>imary Biliary Cirrhosis, PBC)之肝功能改善。

用法用量：

成人每天劑量為13-15mg/kg，分四次服用。

臨床試驗：

依據一項5年隨機雙盲之臨床研究顯示，ursodeoxycholic acid以建議治療劑量（13-15 mg/kg/d）的2倍（28-30 mg/kg/d）治療原發性硬化膽道炎（primary sclerosing cholangitis）之病人（共納入150位），結果顯示，用藥組發生臨床事件（死亡、肝臟移植或minimal listing criteria）的風險為對照組的2.1倍（p<0.05），也有較高發生嚴重不良事件的風險（包含靜脈曲張、肝硬化及膽道癌，63%vs. 37%，p<0.01），此臨床試驗顯示，使用本品肝功能指數雖降低，但反而增加臨床事件風險。

禁忌症：

「完全膽道閉塞患者」及「對ursodeoxycholic acid (ursodiol)成分或本品任一賦形劑過敏，或無法耐受者」。

妊娠：

孕婦或對本成份類似物有過敏症。

注意事項：

- 一、治療六個月後，利用口服膽囊攝影術驗證一下治療有效性為何。
- 二、治療開始，應驗測病患血清Transaminase和Alkaline Phosphatase值。
- 三、避免與可能有肝毒性的藥物併用。
- 四、避免與會錯合或消除膽鹽，Cholesterol的藥物併用，像（Estrogen，Hormone）Hormone Contraceptive和Cholesterol的抑制劑Cholestyramine。
- 五、室溫避光保存。
- 六、本品與經口服糖尿病藥（Tolbutamide等）併用，作用增強。

副作用：

下痢、噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胸悶、胃部不快感、搔癢、發疹，全身倦怠感。

包裝：

“健亞”健膽舒錠100毫克 3~1000錠鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。

“健亞”健膽舒錠 50 毫克 6~1000錠鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。

本藥須由醫師處方使用

健亞生物科技股份有限公司 製造  
新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

IT004E2

175mm