



永信

骨永壯 GLUSTRONG

GSC-006
衛署藥製字第043262號

膠囊

CAPSULES
YUNG SHIN

【成分】

有效成分及含量：每膠囊中含：Crystalline glucosamine sulphate.....314 mg
(相當於250mg之glucosamine sulphate)

其他成分(賦形劑)：Corn Starch、Lactose、Magnesium Stearate、Talc、Capsule #1 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF)。

【用途(適應症)】

緩解退化性關節炎之疼痛。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - 曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - 嚴重肝腎疾病的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. Glucosamine係Causal therapy其治療效果必須從開始治療之後1星期之後才可看到，所以病情嚴重時，在開始治療第1天可加抗發炎藥物和Glucosamine併服。
 4. 本藥應置於小兒伸手不及處。
 5. 請在有效期限內使用。

【用法用量】

關節炎病症	用法用量
輕度至中度	每次2粒，每日2次，連續治療6個星期。
嚴重程度	a. 初期治療：每次2粒，每日3次，持續治療至少8個星期，飯前15分鐘服用。 b. 繼續治療：每次2粒，每日2次，持續治療3~4個月，飯前15分鐘服用。可依醫師處方服用亦可。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏反應，如：紅、腫、癢或起疹子
胃腸	覺得胃不舒服、胃痛、脹氣、便秘、拉肚子、消化不良、噁心、嘔吐

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 過敏反應、伴隨搔癢和紅斑的皮膚性出疹。
2. 若有上述之其他不適情況產生。
3. 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】

8~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】

於25°C以下、避光儲存。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2150611