

好鐵咀嚼錠 100毫克

Hote Chewable Tablets 100mg

衛署藥製字第047456號
G-8789
LT-0275-HO

【主要成份】

每錠含10mg以ferric hydroxide polymaltose complex型式之鐵質。

【特 性】 (依文獻刊載)

此錠用來治療鐵質缺乏症，每錠含有100mg之鐵質，可一天一次給藥。因本錠之鐵係以iron polymaltose complex之型式給予，為非離子性的，所以服用本劑不會引起一般離子性鐵鹽常見的副作用，如胃腸障礙、牙齒變色、金屬味、及與食物或含phenolic group藥物(如Tetracyclines)併服導致之鐵吸收降低。本錠除了耐受性佳外，亦有很高的安全域。Iron polymaltose的急性口服毒性很低，所以意外過度服用所造成之鐵中毒可不必顧慮。經各種身體可用率實驗及臨床試驗證實本錠鐵之吸收利用與亞鐵鹽完全相同。

【適應症】

預防及治療鐵質缺乏症、缺鐵性貧血症。

【禁忌症】

人體中鐵質過量者〔(haemochromatosis(血色素沉著病)、chronic hemolysis(慢性溶血)、鐵質利用障礙者(lead anaemia(鉛性貧血)、sidero-achrestic anaemia(鐵利用不能性貧血))、thalassaemia(地中海貧血)〕。

【相關禁忌症】

傳染性或腫瘤性鐵質不足之貧血症患者，因鐵質儲存在RES中，所以鐵無法被運用，除非原發疾病痊癒。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

正常情況，每天一錠，任何時間服用均可。隨病人喜愛，可隨後飲用液體物。此錠也可以和液體物一起吞食。如果需要，劑量可增加為一天服用二次，每次一錠，依據醫生指示，在餐前、餐後或一起服食均可。為能補充體內鐵質之庫存，在血值(Hb, Ht, 紅血球)正常後，最好再繼續服用一個月。

【治療持續時間】

Hb值為90g/l或以上時的劑量是每天1錠(100mg)，Hb值低於90g/l時，前二星期每天服用2錠，然後每天1錠。

| 體重 (Kg) | 治療持續時間(週) | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | Hb 60 g/l | Hb 75 g/l | Hb 90 g/l | Hb 105 g/l | Hb 120 g/l | Hb 135 g/l |
| 35 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 40 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 45 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 50 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 55 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 60 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 65 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 70 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 75 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| 80 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 85 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 90 | 15 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 |

【注意事項】

服用本品，糞便將呈暗黑色，此為鐵劑吸收正常現象。

【賦形劑】

Sucrose, Cocoa, Lactose, Hydroxypropyl Cellulose L(HPC -L), Sorbitol Solution 70%, Sucralose, Silicon Dioxide(AD-101), Magnesium Stearate

【儲存狀況】

儲存於25°C以下並避免潮濕。

【包裝】

4~1000錠/塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。



優生製藥廠股份有限公司
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201511