

“信隆” **優利鐵** 膠囊

**Your Iron Capsules “S.L.”**

【主成份】每膠囊含  
Iron (Polysaccharide  
Complex) .....150 mg  
Folic Acid .....1 mg  
Cyanocobalamin .....0.025 mg

【性 狀】\* 優利鐵是一個鐵元素與低分子多醣類所形成的一個高水溶性複合物。每顆優利鐵含有 150 公絲的鐵元素，膠囊內為顆粒狀的低分子多醣類鐵複合物。  
\* 本藥是一個容易被人體吸收利用的治療缺鐵性貧血的藥物，因為本藥是一個低分子多醣類鍵的含鐵複合物，也不會像一般鐵劑引起胃腸不舒服。  
\* 本藥不會污染牙齒亦沒有金屬的味道。

【臨床藥理】\* 鐵質—  
1. 紅血球製造時需要適量的鐵份。另外部份酵素也需要鐵質扮演 Cofactor 作用。 如：  
Cytochromes 內之電子傳遞。  
2. 在臨床報告中，本劑與硫酸亞鐵對比，可產生造血反應及增加紅血素與血球容積 (hemotocrit)。  
\* 葉酸—  
核蛋白合成及正常紅血球維持之必需元素。葉酸在肝臟及淋巴液，藉 dihydrofolate reductase 轉化成代謝活性物 tetrahydrofolic acid。  
\* 維他命 B<sub>12</sub>—  
維持正常紅血球、核蛋白、髓磷脂合成及細胞製造正常生長之必要元素。

【適應症】鐵、葉酸、維生素 B<sub>12</sub> 缺乏症。

【用法與用量】每天一次，一次 1 粒。

※本藥須由醫師處方使用

【禁 忌】已知對本劑成分過敏者，有血色沉著病、血鐵質沉著症者。

【副作用】\* 鐵份治療所引起之副作用：便秘、下瀉、噁心、嘔吐、黑糞、胃痛。通常這些徵狀是短暫性。

\* 葉酸口服或注射後曾有過敏反應之報告。

\* 臨床上急性鐵份過量時，可能引起胃痛、反胃、嘔吐、下瀉、黑糞便、低血壓、心搏過速、昏睡、臉色蒼白、疲倦、抽筋甚至昏迷。本劑在老鼠口服 LD<sub>50</sub> 應大 5000 mg<sup>Iron</sup>/kg，慢性性研究，在老鼠及狗，每天劑量 250 mg<sup>Iron</sup>/kg 連續 3 個月尚無副作用報告。

【注意事項】\* 一般服用本藥前，應知道貧血之種類及引起原因。優先改善引起貧血之原因。劑量每日 0.1mg 的葉酸，在隱蔽惡性貧血的症狀，可能會造成加速性神經損害。

\* 本藥請置於小孩伸手不及處。意外的鐵份過量是造成 6 歲以下小孩中毒致死之主要原因。

\* 維他命 B<sub>12</sub> 缺乏時，單獨用葉酸不適合於治療貧血及巨胚性紅血球症。

【醫療提示】告知病患服用本藥會造成黑或棕色糞便。

【賦形劑清單】 Brilliant Blue FCF、Dried Starch、Gelatin、Indigo Carmine、Lactose、Light Anhydrous Silicic Acid、Magnesium Stearate、New Coccin、Sunset Yellow FCF、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide

【貯存方式】室溫（25°C 以下），避光貯藏。

【包 裝】2~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

衛署藥製字第 047050 G-8606 號



信隆藥品工業股份有限公司

Shinlon Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.

台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號