

“政德” 結石清 顆粒

K-Citrate granules “Gentle”

K-Citrate 顆粒是一種口服全身性鹼性劑，當患者須要維持長期鹼性尿液如溶解尿道之尿酸結石，胱胺酸鈣結石，本品可促進尿酸之排泄，治療由尿酸、胱胺酸及多種鈣結石，為口服尿道結石之治療劑。

本品口服後 pot. citrate 代謝為 pot. bicarbonate 可作為全身性鹼化劑，增加尿液 pH 值，降低草酸鈣與磷酸鈣之過飽和狀態，防止結石形成，降低尿中未溶尿酸量，減少尿酸沉澱。

成 分：Each gm contains：

主成分：

Potassium citrate monohydrate.....660mg

Citric acid Anhydrous.....200.4mg

賦形劑：

Mannitol

Saccharin sodium

Sodium cyclamate

Orange powder

Colloidal Silicon Dioxide

適應症：鹼化劑(用於須長期保持尿鹼性之場合如尿道結石、腎小管性酸毒症)。

用法用量：通常成人一日四次，每次 1 包 5 公克(加 180ml 冷開水或果汁混勻服用)飯後或睡前服用。可維持尿液 pH 值 6.5~7.4。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 嚴重腎障礙伴隨尿少症或氮血症者，未治癒之 Addison's 症者、Adynamia episodica hereditaria 急性脫水、熱痙攣、嚴重心肌損害及任何原因引起之高鉀血症者禁用。
2. 腎病患者大劑量會引起高鉀血症及鹼中毒。
3. 排尿量少之患者須在醫師監視下小心使用本劑。
4. 本品含高濃度的鉀，必須先加水稀釋後再服用，以減少對腸胃道之傷害，且於飯後服用可避免造成緩瀉作用。
5. 孕婦及授乳婦須小心使用，小孩使用時須適宜調整用量。
6. 腎功能正常及排尿量正常者，在一般劑下無不適之副作用，但對腎機能不正常者可能會引起高鉀血或鹼中毒症狀，如無精打采、神智昏眩、不安及其他伴隨血中高濃度鉀所引起之症狀，應定期測定血中電解質含量，以避免副作用發生。高血鉀會引起心電圖異常、P. wave 消失、QRS 加寬與模糊、S-T 改變、T. wave 波峰加高。
7. 腎功能不良者過量會引起高鉀血症，必須立即加以治療，以免引起生命危險。
8. 同時使用含鉀藥物，鉀滯留之利尿劑及強心配醣體者，可能引起毒性。

包 裝：5 公克/鋁箔包 8 ~ 200 包盒裝。



政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號