

# “明德” 咳得寧錠

## KODERLIN Tablets “MEIDER”

咳嗽是氣管呼吸不順之現象，通常愈想忍著不咳，愈咳得厲害，激烈的咳嗽，不但使體力衰弱，且加重肺和心臟的負擔，因而高血壓的患者，以及久病體弱的患者，常有因激烈不停的咳嗽而誘發休克的病例，因此無論何種起因的咳嗽，都宜早期治療才是良藥。

本劑能迅速消除其炎症，同時能除去粘膜表面的粘痰，而促進正常黏液之分泌。因此服用本劑能使痰塊易於咯出，並且緩和乾燥性咳嗽，減少痛苦。

### 【成分】 Each Tablet Contains :

Guaiacol Glyceryl Ether	88mg
Codeine Phosphate	4.8mg
DL-Methylephedrine HCL	20mg
Crude Glycyrrhiza extract	60mg
Senega extract	60mg

【賦形劑】 Lactose, Magnesium Sterate, Povidone, Potato Starch, Calcium Carboxymethylcellulose

【效能】 鎮咳、祛痰（急慢性支氣管炎、急慢性喉頭炎、咽頭炎等、引起之咳嗽、喀痰）。

【用法用量】 通常成人每次一錠，十五歲~八歲半錠，一日三次於飯後服之。

【類別】 本藥須由醫師處方使用。

### 【注意事項】

1 本劑含 codeine phosphate，久服會成癮，請避免久服。

### 【禁忌症】

1 已知CYP2D6 超級快速藥物代謝者(ultra-rapid metabolizers)。

2 哺乳婦女。

### 【警語】

1 Codeine 會經由肝臟酵素CYP2D6 代謝為活性成分 morphine。如果病人屬於快速代謝者(extensive metabolizer)或超級快速代謝者(ultra-rapid etabolizer)，即使是在正常使用劑量，亦可能會發生鴉片中毒症狀，且可以於病人血液中檢測到比預期高之morphine成分。在亞洲族群，超級快速代謝者(ultra-rapid metabolizer)之盛行率為1.2%~2%。一般鴉片中毒症狀包括意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸緩慢或微弱、瞳孔變小、噁心、嘔吐、便秘、食慾不振等，嚴重會導致呼吸抑制，甚至導致死亡。

2 謹慎使用本品於未滿12 歲兒童，因可能會增加發生嚴重不良反應之風險。經醫師專業評估臨床效益大於風險時，方可考慮使用，且應依年齡減量使用，並特別提醒病人及其照護者，如發生鴉片中毒之相關症狀，應立即停藥並就醫治療。

3 不建議使用本品於12 至18 歲具呼吸功能不全之兒童，例如具有神經肌肉疾病、嚴重心臟或呼吸系統疾病、上呼吸道或肺部感染及多重創傷或大範圍外科手術等，因可能會增加發生嚴重不良反應之風險，倘經評估仍需使用，應特別提醒病人及其照護者，如發生鴉片中毒之相關症狀，應立即停藥並就醫治療。

4 禁止產婦於哺乳期間使用本品，因可能對於受哺乳嬰兒造成鴉片中毒之風險。雖然在正常治療劑量下，母乳中僅存在極低濃度之codeine 與其活性代謝物，不太會對嬰兒產生不良反應，但屬CYP2D6 超級快速藥物代謝之哺乳婦女，母乳中可能會存在高濃度之活性代謝物，可能對於受哺乳嬰兒產生鴉片中毒症狀，例如異常嗜睡、癱軟、餵養困難、呼吸困難，嚴重可能會致死。因此，產婦如需使用本品治療，應避免以用藥期間之母乳哺餵嬰兒。

5 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

6 長期使用易致成癮。

7 腎上腺功能不全風險:曾有使用opioid 類藥品發生腎上腺功能不全之通報案例，且多數案例為使用該類藥品超過一個月者。腎上腺功能不全可能以非特异性症狀表現，例如噁心、嘔吐、厭食、疲倦、虛弱、眩暈及低血壓等。如懷疑病人發生腎上腺功能不全，應儘速進行相關檢查，倘經確診為腎上腺功能不全，應停止使用原opioid 成分藥品，並持續使用皮質類固醇類藥品進行治療，直到腎上腺功能復原。另可嘗試使用其他不同成分之opioid 藥品，因曾有通報案件，於更換其他不同成分之opioid 藥品後，未再出現腎上腺功能不全之情形。惟依目前現有資料，尚無法認定有特定opioid 成分與腎上腺功能不全較有相關性。

8 併用benzodiazepine 類藥品或其他中樞神經系統抑制劑之風險:含codeine 成分藥品併用benzodiazepine 類藥品或其他中樞神經系統抑制劑(如:肌肉鬆弛劑、全身麻醉劑、酒精)，可能會引起重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡等風險，故除非無其他適當治療方式，方可考慮使用。倘同時處方opioid 類止痛藥品及benzodiazepine 成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑，應使用最低有效劑量及最短治療期程。當對於正在使用opioid 類止痛藥品之病人，新增處方benzodiazepine 成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑時，抑或針對正在使用benzodiazepine 成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑之病人，新增處方opioid 類止痛藥品時，應使用較低之初始劑量，且依據病人臨床表現調整劑量，並嚴密監測病人相關不良反應之發生。此外，應特別提醒病人及護理人員注意呼吸抑制和鎮靜之風險，病人於用藥期間亦不宜駕駛或操作危險器械。另針對具有濫用藥物可能之病人，應警告病人切勿飲酒或使用不法濫用藥物，否則可能有過量及致死之風險。

### 【副作用】

1 雄性激素缺乏:曾有使用opioid 類藥品發生雄性激素缺乏之通報案例，且多數案例為使用該藥品超過一個月者。

2 血清素症候群:曾有使用opioid 類藥品併用血清素作用劑藥品(serotonergic drugs)發生危及生命之血清素症候群(serotonin syndrome)通報案例。

【包裝】 6~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】 25℃以下。

明德製藥股份有限公司  
桃園市楊梅區民富路二段 360 號