

## “吳羽”克裏美淨®細粒 KREMEZIN®

## 【性狀】

KREMEZIN 藥品物質是經由在高溫下氧化還原球型活性炭而得到之球狀具吸附力之碳，原料活性炭則是衍生自石油的碳氫化合物。

## 【成分】

**有效成分及含量：每包含 2 公克 Spherical Absorptive Carbon (活性炭)。**

其他成分(賦形劑)：無添加賦形劑。

## 【用途(適應症)】緊急治療藥物或化學品中毒之病人。吸附干擾胃腸道的細菌性毒素、消化性毒素及其他有機

性廢物、解除腸內滯留氣體及有關症狀。

## 【使用上注意事項】

## 一、有下列情形者，請勿使用：

1. 必須使用口服特殊之解毒劑的人。
2. 有消化道輸送失調 (transit disorder) 的人。
3. 腐蝕性物質引起之中毒的人。
4. 曾因本藥成分引起過敏的人。
5. 當合併使用其他口服藥物，在考量本產品為吸附劑的情況下，不應同時使用。

## 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 消化性潰瘍或食道靜脈曲張的人，因本藥可能會造成局部刺激 (本產品是以固態狀態下經過消化道，可能會刺激經過區域)。
2. 便秘的人。
3. 肝臟疾病的人。
4. 正在服用避孕藥的人。
5. 不確定中毒原因的人。

## 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 正在服用其他藥品的人，特別是治療高血壓用藥、治療類風濕關節炎藥品等。
2. 對於有些中毒情況，可能需要併用其他類別的解毒劑，應經過醫師診治使用。
3. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

## 四、其他使用上注意事項：

1. 服用本藥品可能會造成黑便，並加重便秘的情況。
2. 發生中毒時，先使用本藥品後仍應立即送醫急救。

## 【用法用量】

成人及 12 歲以上	急性中毒時，儘快使用 50-100 公克之活性炭 (25-50 包)。
	嚴重中毒時，服用初劑量後，每 4 至 6 小時應再服用 20 公克活性炭 (10 包)，連續數天。“吳羽”克裏美淨可在嘔吐或洗胃後使用。
12 歲以下兒童	每公斤體重給予 1 公克之活性炭。急性中毒時，依小孩之體重和中毒之程度給予 10-50 公克之活性炭 (5-25 包)。
	幼兒初劑量給予 10-20 公克之活性炭 (5-10 包)，數分鐘後根據醫師指示，可重複給藥。
	較大的小孩則儘量給予大劑量 30-50 公克之活性炭 (15-25 包)。

## 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用時，請立即停止使用，並將此說明書諮詢醫師、藥師、藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 若經醫師、藥師、藥劑生指示使用後，症狀沒有改善。

## 【包裝】

2gm 鋁箔包裝，3~500 包盒裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】15-30℃

製造廠：Kureha Corporation

製造廠址：16, Ochiai, Nishiki-machi, Iwaki,  
Fukushima, Japan

製造廠公司地址：3-3-2 Nihonbashi Hamacho, Chuo-ku,  
Tokyo 103-8552

分包裝廠：昱昇藥業有限公司桃園廠

分包裝廠地址：桃園縣蘆竹鄉南山路一段 436 號

藥商：杏昌醫藥科技股份有限公司

藥商地址：台北市松山區民生東路三段 107 巷  
6 號 2 樓

藥商電話：02-2715-1651

諮詢電話：0800-235393

