

樂多

糖漿666毫克/毫升(拉特樂斯)

LACTUL Syrup 666mg/mL “*Sinphar*”
(Lactulose)

—— 緩瀉劑 ——

Lactulose是一種雙醣類，由Galactose和Fructose組合而成，它幾乎不被消化道吸收，且不具熱能，在被腸內細菌分解後形成低分子量的有機酸acetic acid、lactic acid，能酸化腸內容物，當腸內容物的酸度大於血液時，會將血液中的NH₃轉移至腸道中形成NH₄⁺，並限制其再吸收到血液中，而導致緩瀉作用，並可治療及預防Portal-systemic encephalopathy。以Lactulose治療病患時，通常可發現其蛋白質耐受性會增高。

成分：每ml含：

Lactulose.....666mg

賦形劑：

Water Purified.

適應症：

患病期慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷。

用法用量：

- 1.治療便秘：成人一天15~30ml，需要時可增加到60ml每天，24~48小時內會恢復正常的腸蠕動。
- 2.治療預防Portal-systemic encephalopathy：
 - 口服：成人：一日三~四回，一回30~45ml
 - 嬰兒：一日劑量，2.5~10ml
 - 小孩：一日劑量，40~90ml
 - 持續劑量則依個人的反應，再作增減。
 - 直腸灌腸：本品300ml以700ml之水或生理食鹽水稀釋，放置30~60分鐘。

注意事項：

- 1.因本品含少量的galactose及lactose所以糖尿病患及半乳糖血症(galactosemia)病患，須小心謹慎給藥。
- 2.本品可使用於孕婦及小孩，但嬰兒在使用Lactulose時可能會引起低血鈉症(hyponatremia)及脫水症狀。
- 3.本品不具成癮性。
- 4.用藥過量時可能產生脫水、低血鉀症、噁心、嘔吐等症狀。
- 5.避光及室溫(15~30°C)貯存。
- 6.在室溫良好條件貯存下，顏色變深並不影響療效。
- 7.長期置於30°C以上或光直射時，易變成極深色及混濁，當此現象發生時，請勿再使用；長期置於冷凍溫度時，呈半固體狀、變稠、不易倒出，但恢復至室溫時，即可恢復原狀，不影響療效。
- 8.請置於孩童不易取得處。
- 9.如覺口味不適時，可與果汁、白開水、牛乳混合後使用。
- 10.用Lactulose治療之病患，需要作電燒處置或作大腸直腸鏡檢時有理論上的危險性；由於若氫氣累積到相當濃度時，電氣火花可能會引發爆炸反應，因此可充氣CO₂作為額外安全處理。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第039701號
G-5196號

包裝：30~4000毫升塑膠瓶裝。



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com