

PIC/S GMP
優良藥品

生物活性 CHOLECALCIFEROL

“漁人”骨活醇軟膠囊 0.25 微克

MACALOL Soft Capsules 0.25 μ g "F.M."

【主成份】 Each Soft Capsule Contains :
1 α , 25-Dihydroxycholecalciferol.....0.25 μ g

【賦形劑】

Butylated hydroxyanisole, Butylated hydroxytoluene, Triglyceride of coconut oil, Gelatin, Glycerin, Vanillin, Potassium sorbate, Titanium Dioxide, Cochineal Red A, Purified Water.

【作用】

本品為最具活性之Cholecalciferol，能直接作用於腸管與骨骼，口服Macalol可促進小腸吸收鈣質、調節骨骼礦物化作用。血中鈣濃度能提昇減輕骨骼、肌肉疼痛，防止骨質流失、骨質疏鬆。對於腎臟衰竭之病人，特別是長期施行血液透析者，內因性之Calcitriol合成大為減少，甚至完全停止。此種Calcitriol缺乏是形成腎臟性骨骼營養不良最主要之原因。口服Macalol可獲改善。

Macalol又可促使過高之血清鹼性磷酸酶趨於正常及促使過高之血清副甲狀腺荷爾蒙濃度趨於正常。

【適應症】

佝僂症、軟骨症、促進磷、鈣之吸收、維他命D缺乏症、過敏性疾患。

【用法用量】

初劑量為一天一粒，必要時可每隔2~4週每天之劑量增加一粒。大多數人一天服用2~4粒，即可獲得滿意之效果。鈣之血中濃度達正常值後，骨活醇之治療可以繼續，但劑量應較以前減少一粒。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 禁忌症：高鈣血症、維他命D過多症。
2. 懷孕期間應特別小心使用。
3. 治療期間停止所有其他維他命D之補充，以減少高鈣血症之危險。
4. 注意嘔吐、虛弱、肌肉或骨骼疼痛之發生，因這些症狀可能表示高鈣血症。
5. 骨活醇軟膠囊治療期間不可服用含鎂制酸劑或緩瀉劑，以免引起高鎂血症。
6. 在治療期間提供適當鈣的補充，因本劑的效用依賴鈣的充分攝取，成人每日鈣的最佳攝取量為1000mg。

【儲存條件】 25°C以下陰涼乾燥處。

【包裝】 2~1000粒塑膠瓶裝、玻璃瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第034854號 GMP G-2759

漁人製藥股份有限公司

高雄市左營區民族一路707號