

# "信東" 麥咳喘 錠25微公克

## **Mecater** Tablets 25mcg (Procaterol Hydrochloride Hemihydrate)

本品為支氣管擴張劑，微量即能發揮支氣管擴張作用，作用迅速且持續時間長，對氣管平滑肌  $\beta_2$ -感受體選擇性高，抗過敏作用強，對心血管系影響輕微，耐受性良好，被認為是理想的治療劑。

### 【特長】

#### 1.支氣管擴張作用—

Procaterol錠有緩解支氣管痙攣作用，與Isoproterenol有同等支氣管擴張的作用，但較Salbutamol等強。

#### 2.支氣管擴張作用時間持續長久—

Procaterol錠支氣管擴張作用時間持續較Isoproterenol、Salbutamol長。

#### 3. $\beta_2$ -感受體選擇性高—

Procaterol錠對心血管系無不良影響，對心血管系及氣管的  $\beta_2$ -感受體的親合力較Isoproterenol、Salbutamol優。

#### 4.抗過敏作用—

Procaterol錠對誘發氣喘的游離組織胺(Histamine)有強力的抑制作用。

#### 5.對氣管的分泌作用—

Procaterol錠促進氣管內纖毛運動亢進作用，而顯著的影響氣管分泌作用。

### 【成分】

主成分：每錠含：Procaterol Hydrochloride Hemihydrate.....25mcg

賦形劑：Lactose Monohydrate、Avicel 101、Povidone K-25、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

### 【適應症】

支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

### 【用法與用量】

**本藥須由醫師處方使用。**

通常成人1日1回，1回2錠，就寢前服用或早晨、就寢前各服1錠。

6歲以上的兒童，1日1回，1回1錠，就寢前服用或早晨、就寢前分別各服1錠。

服用劑量得依年齡、症狀適宜的增減。

### 【注意事項】

#### ■一般的注意

(1) 依正確的用法及用量使用，效果不彰時，本劑可能不適合，考慮中止投與。

(2) 連續過量使用時，可能會發生不整脈，更有引起心跳停止，請小心勿過量使用。

#### ■下列患者慎重投與：

(1) 甲狀腺機能亢進 (2) 高血壓 (3) 心疾患 (4) 糖尿病

## ■副作用

- (1)循環系：偶有心悸。
- (2)精神神經系：偶有震顫、頭痛、目眩、失眠、耳鳴。
- (3)胃腸系：偶有噁心。
- (4)過敏症：偶有皮疹出現。
- (5)其他：偶有口渴、鼻塞。

## ■孕婦的投與：

妊娠中投與的安全性仍未確立。對於孕婦或可能懷孕的婦女，除非認為治療上的益處勝過危險性才可投與。

## ■相互作用：

本劑與Epinephrine及Isoproterenol等之Catecholamine併用時，可能引起不整脈，更會導致心跳停止，應避免使用。

## ■臨床檢查值的影響：

本劑會抑制allergen(過敏原)引起的皮膚反應，欲實施皮膚試驗時，須在12小時前停藥。


## 【性狀】

化學名：(±)-erythro-8-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)butyl]-carbostyryl.

分子式： $C_{16}H_{22}N_2O_3 \cdot HCl \cdot \frac{1}{2}H_2O$

分子量：290.36 (· 45.46)

化學構造式：



## 【貯存】

貯存於室溫15~30℃，避光貯存。

須置於小孩接觸不到之處。

## 【包裝】

4~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝，1~10包鋁箔袋盒裝(每包100粒)。

衛署藥製字第045492號



信東生技股份有限公司  
桃園市桃園區介壽路22號

54130460③