

修訂日期:2017年\*\*月  
保存期限:見外箱所示

活菌製劑  
**妙利散®**  
(MIYARISAN® BM)  
整腸劑

衛署藥輸字第 014618 號  
醫師藥師藥劑生指示藥品

妙利散®是以整腸活菌—宮入菌 (*Clostridium butyricum* MIYAIRI) 為主成分的整腸劑。

【成分】

有效成分及含量:本藥1g (1包) 中含*Clostridium butyricum* MIYAIRI 40mg。

其他成分 (賦形劑): Lactose Hydrate, Corn Starch, Precipitated Calcium Carbonate。

藥品名	劑型	顏色	識別標記
妙利散	細粒劑	白~淡灰白色	Ⓞ

【用途(適應症)】

緩解輕度腹瀉、腹痛及便秘、整腸 (調整排便)、軟便。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (二) 對牛乳或乳製品耐受度低的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治
  - (一) 3歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
  - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意：
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量。
  - (四) 有發燒症狀時，使用不得超過48小時。
  - (五) 與Aminophylline、Isoniazid混合時，會使本藥品變色，所以應避免與這兩種成分藥品一起使用。

【用法用量】 一天3至4次，或需要時服用。

年齡	劑量
12歲以上	每次1包
6歲以上未滿12歲	每次半包
3歲以上未滿6歲	每次四分之一包
3歲以下	請洽醫師診治

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	偶有脹氣

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
  - (一) 若有任何不適情況產生。
  - (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】 6~1000包 (每包1g) 紙盒裝，6~1000公克 (g) 玻璃瓶裝。

【儲存】 25℃以下避光乾燥處儲存。

製造廠：ミヤリサン製薬株式会社  
日本長野県埴科郡坂城町中之条102番地15  
MIYARISAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
102-15, Nakanojo, Sakaki-machi, Hanishinagun, Nagano, Japan  
藥商：裕心企業有限公司  
地址：高雄市苓雅區青年一路1-3號

