

"元宙" 肌緩痛 錠  
Mocolax Tablets "Y. C."

衛部藥製字第 058589 號  
GMP G-12485

【成分】 Each tablet contains:

Phenprobamate..... 400 mg

【適應症】 筋痙攣、筋硬直等肌肉異常緊張之緩解。

【用法用量】 成人每次一錠，一日二至三次，依症狀劑量可行增減。

本藥須由醫師處方使用。

【藥理作用】 本藥對大腦皮質下具有抑制polysynaptic反射作用，故能遮斷由異常興奮引起之神經傳導，使骨骼筋弛緩及適當之鎮痛作用。

在臨床試驗中具：

1. 筋弛緩作用。
2. 抗痙攣作用。
3. 運動亢進之抑制作用。
4. 麻醉時間之延長作用。

由筋肉弛緩、引起局部的循環血量增加、使代謝圓滑進行，故能延長知覺、減低運動神經的興奮，減少筋肉之電氣活動，減輕對疼痛之感受性。本藥對睡眠中樞無直接影響，但可緩解對筋緊張引起之不眠症。

【使用上之注意】 (1)一般的注意：

因會引起睡意，注意力、集中力、反射運動能力等之低下的狀況發生，所以口服本藥之患者，注意不要從事汽車等具有危險性機械之操作。

(2)下列之患者不要服用：

對本藥及類似化合物曾經有過敏症患者。

(3)下列之患者要慎重服用：

肝、腎障礙患者。

(4)副作用：

①過敏症：有顯現發疹等之過敏症狀時停止服用。

②精神神經系：偶爾有顯現睡意、暈眩、搖晃、頭痛、頭重感、脫力感、倦怠感等之症狀，所以顯現這種病症時作減量或停藥等適當之處置。

③消化器系：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、心悶、胃口難受、稍有顯現下痢、便秘、心窩痛、胃痛等之症狀。

(5)對乳兒、小兒、孕婦、授乳婦之服用：

懷孕中之服用及因還沒確定對於乳兒、小兒之安全性，所以對於孕婦或有可能懷孕之婦人，及乳兒、小兒僅在被判斷於治療上之有益性比危險性還要大時才服用。又希望授乳中婦人不要服用。

(6)相互作用：

與下列之醫藥品併用或飲酒因會相互作用而增強，所以希望能單獨服用，但不可抗拒要併用時請注意減量服用：

Phenothiazine系藥劑、barbital酸誘導體等之中樞神經抑制劑、monoamine氧化酵素阻礙劑。

- 【藥效藥理】** (1)根據於mouse及貓之實驗，對肌運動有關多項神經軸反射路發生作用，而遮斷其因異常興奮之神經傳導，顯現出中樞性之骨骼肌鬆弛作用。
- (2)根據於rat之實驗，具有與phenylbutazone同等的抗炎症作用，於mouse之實驗也具有鎮痛作用。
- (3)根據於兔子之實驗，對自律神經可以說毫無任何影響。
- (4)以健康成人為對象進行試驗，在口服平常用量時，安靜時減少肌活動，於口服大量時，是有報告顯示，對精神狀態會稍有強一點之影響。
- 非臨床試驗：

**【毒性】** 1.急性毒性 LD50(mg/kg)

動物		使用方法		
		性別	口服	皮下
mouse (JCL-ICR)	♂	589.6	1,614	231
	♀	762	1,731	298
Rat (wistar)	♂	1,692		281.5
	♀	1,530		

2.亞急性毒性

於兔子及rat同時以phenprobamate各予150 mg/kg，200 mg/kg，連續口服3個月後之結果，兩個動物皆體重增加且無障害，在於血液檢查上，也確認沒有變化，又在肝、腎、消化管、脾、心、肺等之各臟器，也確認沒有組織病理學的變化。

**【賦形劑】** Starch、Lactose monohydrate、PVP K90、Primogel、Magnesium stearate、Tartrazine aluminum lake。

**【儲存】** 於25℃以下儲存。

**【包裝】** 6-1000錠PTP鋁箔盒裝、HDPE塑膠瓶裝。



**元宙化學製藥股份有限公司**  
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路272號  
**T E L : (049)2253190**