樂 瑪 可 顆粒劑

Normacol Plus Granules

衛署藥輸字第 017218 號

成分:

棕色顆粒,主要含 62% Sterculia 及 8% Frangula。

適應症:

緩解便秘。

說明:

本品用於治療便秘,特別是對單獨使用膨脹性瀉劑無效之腸蠕動無力或弛緩 的便秘。

本品亦適於直腸手術和痔瘡手術後,用於啟動和維持腸道的蠕動。

用法、用量:

內服顆粒劑。

成人: -天1~2次,每次1~2包。餐後服用。

兒童(6~12歲):由醫師決定所需使用減低的劑量。

將顆粒直接放入口中,勿咀嚼或壓碎,配合充分水或冷飲吞服。

禁忌:

腸阻塞、糞便嵌塞、腸道完全無張力、懷孕及哺乳婦女及對本品成分過敏 者請勿使用。

注意事項:

- 1. 勿於就寢前服用,特別是老年人。
- 2. 應維持適量水的攝取。
- 3. 潰瘍性結腸炎者須小心使用。
- 4. 尚無懷孕婦女服用報告,目前已知 Frangula 會穿越胎盤且動物報告顯示 出現基因毒性,因此懷孕期禁止使用。
- 5. 並無資料顯示 Sterculia 會分泌至乳汁, Frangula 或其代謝物是否會分 泌進入人類乳汁亦未知,但有研究顯示其他治療便秘之 Anthranoids 之 代謝物會分泌至乳汁,故無法排除未斷奶小孩的風險,婦女哺乳期禁止 使用。
- 6. 若使用本品 4 天仍未排便,請立即停止使用。

副作用:

腹脹。

若本品服用過量或未飲用足量的水,可能出現腸阻塞。

過量

於服用過量時,可能會出現腸阻塞,特別是在未飲用足量水的情況下。處 置方式與其他原因所致腸阻塞相同。

類別:

醫師藥師藥劑生指示藥品。

はた

25℃ 陰涼、乾燥處存放。

包裝:

7 克/包,30 包/盒。

委託製造者: Norgine Limited

Uxbridge Middlesex UB9 6NS U.K.

受託製造廠: Norgine Pharma

地 : 29 rue Ethé Virton 28109 Dreux Cedex France

藥 商: 台灣美強股份有限公司

台北市南京東路二段 66 號 4F