

“衛達” 我喜滿 錠 5 公絲
(奧斯必得寧)

Oxyban Tablets 5mg "Weidar"
(Oxybutinin)

GMP G-2533

CODE NO. OB-0790



【成分】：每錠含有：Oxybutynin Chloride 5mg

賦形劑：Cellulose microcrystalline, Lactose, Brilliant blue FCF aluminum lake, Carmellose calcium (ECG 505), Calcium stearate

【臨床藥理】：

本產品對平滑肌有直接的抗痙攣作用，並可抑制 **Acetylcholine** 對平滑肌的 **muscarinic** 作用。對於骨骼肌—神經結合或自主神經結沒有阻斷作用。(無 **antinicotinic** 作用)

本品可鬆弛膀胱平滑肌。對於有非自願性膀胱收縮情況的病人，本品經證實可以增加其膀胱容積，減少其逼尿肌失控的收縮頻率，並可延緩欲排尿的感覺。本品因此可減少尿失禁或正常排尿時尿急和頻尿的情況發生。

【適應症】：

因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。

【用法用量】：

成人一般劑量 **5mg(1 錠)**，一日 **2~3 次**。最高劑量 **5mg(1 錠)**，一日 **4 次**。

五歲以上小孩一般劑量是 **5mg(1 錠)**，1 日 **2 次**。最高劑量 **5mg(1 錠)**，1 日 **3 次**。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】：

1. 眼內壓增加(如青光眼)伴隨眼角閉合者。
2. 腸胃道部分或全部阻塞者，迴腸痙攣者，老年人或衰弱患者之腸道弛緩者，巨結腸者，巨結腸併發之潰瘍性結腸炎者，嚴重結腸炎者，重肌無力症者。
3. 閉塞性泌尿道病變者，急性出血導致心血管情況不穩定者。
4. 對本品過敏者。

【警語】：

1. 本品於高溫下給與，可能導致熱衰竭(因減少流汗量而導致發燒、中暑)。
2. 下痢可能為腸道不完全阻塞之早期症狀，特別是有做迴腸造口術及結腸造口術的患者。在此情況下，使用本品可能不適當甚或有害。
3. 服用本品可能產生嗜睡或視覺模糊的情況。故服用本品的病人，若須從事精神集中的工作，例如開車，機械操作或有危險性的工作時，須小心注意。
4. 酒精或其他鎮定劑會加重本品嗜睡作用。

【注意】：

1. 老年人，自主神經病變者，肝或腎疾患者須小心使用。
2. 使用本品會加重下列症狀：甲狀腺機能亢進、冠狀心臟疾病、充血性心衰竭、充血性心衰竭、心律不整、裂孔赫尼亞、心搏過速、高血壓、前列腺肥大。
3. 患有潰瘍性結腸炎的患者，服用本品可能會因抑制腸道的蠕動而導致迴腸痙攣，進而促進或加重其嚴重併發症—毒性巨結腸之發生。
4. 本品對已懷孕或可能懷孕之婦女，其安全性尚未建立，故若非經醫師評估，其臨床效用確實大於可能發生之傷害者，本品不建議使用。
5. 本品是否會分泌於乳汁中尚未得知。因許多藥物均會分泌乳汁中，故授乳婦女須小心使用。
6. 5 歲以下小孩不建議使用。

【副作用】：

使用本品後，若合併其他抗膽鹼藥物使用時，可能會發生下列症狀：

心血管方面：心悸、心搏過速、血管擴張。

皮膚：流汗量減少、皮疹。

生殖泌尿道：便秘、胃腸道蠕動減少、口乾、噁心、尿滯留。

神經系統：衰弱、睫狀肌麻痺、淚液分泌減少、瞳孔放大。

其他：陽萎、抑制乳汁分泌。

【過量使用】：

過量使用的症狀和其他抗膽鹼藥物相同，包括中樞神經系統興奮症狀(例如不安、震顫、興奮增盛、搖擺、瞋妄、幻覺)，潮紅、發燒、噁心、嘔吐、心搏過速、低血壓或高血壓、呼吸衰竭、麻痺、昏迷。

若有過量使用或反應過度，則採取症狀和支持療法。維持呼吸並催吐或洗胃(先前昏迷、痙攣或精神病發者不可催吐)，活性炭或瀉藥皆可使用。**Physostigmine** 可解除抗膽鹼藥物中毒的症狀，過高熱症狀可以冰袋或其他冰涼設備或酒精海綿做症狀處理。

【儲存條件】：本品應置於避光緊密之容器中。

【包裝】：4-1000 錠瓶裝。

衛署藥製字第 034366 號
LT-OB

衛達化學製藥股份有限公司

台中市工業區 23 路 21 號

最後修訂日期：104.11.2