

“晟德” 葡萄口味 60ML  
**安佳熱** 糖漿 24 毫克/毫升  
**Anti-phen** Syrup 24 mg/ml  
 “Center”



LOT:  
 EXP:

OPEN

**【成分】：每毫升(ml)含有**  
**有效成分及含量：Acetaminophen..... 24 mg**  
**其他成分(賦形劑)：**Polyethylene Glycol 4000, Sodium Benzoate, Ammonium Glycyrhizinate, Aspartame, Sodium Citrate, High Fructose Syrup, Edetate Disodium, Grape Flavour, Allura Red AC, Brilliant Blue FCF, Water Purified  
**【用途(適應症)】：**退烧、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。  
**【不得使用族群】：**1. 曾因本藥成分引起過敏的人。  
 2. 苯酮尿症的人，因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。  
**【用法用量】：**發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過5次。成人及12歲以上每次20-30毫升、6歲以上未滿12歲每次10-15毫升、3歲以上未滿6歲每次5-7.5毫升、3歲以下請洽醫師診治。  
**【類別】：**醫師藥師藥劑生指示藥品 衛署藥製字第040164號  
 諮詢專線：(02)2655-8680  
 本藥通用藥毒救濟制度  
 新竹縣湖口鄉實踐路2號 晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠  
 CENTER LABORATORIES INC.



4 171925 610000 591  
 每天 一次 每次 1ml



品名:晟德安佳熱糖漿  
 諮詢專線:(02)2655-8680

葡萄口味 “晟德”安佳熱糖漿 24毫克/毫升 Anti-phen Syrup 24mg/ml “Center” 衛署藥製字第040164號

**【成分】：每毫升(ml)含有**  
**有效成分及含量：Acetaminophen..... 24 mg**  
**其他成分(賦形劑)：**Polyethylene Glycol 4000, Sodium Benzoate, Ammonium Glycyrhizinate, Aspartame, Sodium Citrate, High Fructose Syrup, Edetate Disodium, Grape Flavour, Allura Red AC, Brilliant Blue FCF, Water Purified  
**【用途(適應症)】：**退烧、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。  
**【使用上注意事項】：**  
 1. 有下列情形者，請勿使用：  
 (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。  
 (2) 苯酮尿症的人，因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。  
 2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：  
 (1) 3歲以下。  
 (2) 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。  
 (3) 有肝臟疾病的人。  
 3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：  
 (1) 孕婦，可能懷孕婦女及哺乳婦。  
 (2) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退烧或綜合感冒等藥品。  
 4. 其他使用上注意事項：  
 (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。  
 (2) 避免陽光直射。  
 (3) 勿超過建議劑量。  
 (4) 服用過量的Acetaminophen可能是因想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。  
 (5) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen(paracetamol)有急性肝衰竭的風險。  
**【用法用量】：**發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過5次。

年齡	每次用量
成人及12歲以上	20-30毫升
6歲以上未滿12歲	10-15毫升
3歲以上未滿6歲	5-7.5毫升
3歲以下	請洽醫師診治

**【警語】：**1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：


身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(1) 若有任何不適情況產生。  
 (2) 使用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。  
 (3) 使用過量[每日超過4000毫克(mg)]，或使用藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。  
 (4) 有過敏情形，臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、瘙癢及嘔吐。  
**【包裝】：**20-4000毫升塑膠瓶裝  
**【類別】：**醫師藥師藥劑生指示藥品  
**【儲存】：**請密封儲存於25°C以下，不須冰存。

晟德大藥廠(股)公司(新竹廠)

公司地址：  
 臺北市南港區園區街3之2號7樓  
 製造廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號  
 諮詢專線：(02)2655-8680



品名:晟德安佳熱糖漿  
 用途(適應症): 退烧、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。  
 用法用量: 發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服用，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過5次。  
 成人及12歲以上每次20-30毫升  
 6歲以上未滿12歲每次10-15毫升  
 3歲以上未滿6歲每次5-7.5毫升  
 3歲以下洽醫師診治  
 劑型與特徵: 糖漿; 紫色葡萄味  
 諮詢專線: (02)2655-8680