



“正和” **膀 抑 錠** 5公絲 (羥布托尼)

Par Yih Tablets 5 mg “C.H.” (Oxybutynin Chloride)

膀抑錠為合成的抗膽鹼激素劑，直接作用於膀胱之平滑肌上，在平滑肌發揮抗痙攣作用，並在神經節後膽鹼激性部位抑制乙醯膽鹼作用，因而增加膀胱容量；並由於減少到達壓迫肌的運動傳導次數，而延遲排泄的起始需求。

※成 份：每錠中含有：

Oxybutynin Chloride5 mg

※適 應 症：因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。

※用法用量：成人一天2~3次，一次5mg。

五歲以上之小孩：一天2次，一次2.5~5mg，本藥需由醫師處方使用。

- ※注意事項：
1. 定期中斷治療以測定患者繼續治療的需要，有些患者會發生耐受性。
 2. 結腸造口術或迴腸造口術的患者應仔細監測；腹部滯留及下痢的發生，可能為腸阻塞或毒性巨結腸的早期徵兆。
 3. 因本劑會引起眩暈，嗜睡，視覺模糊；注意患者對藥物的反應，確知以前應避免駕駛或從事有危險性的活動。
 4. 勸告患者避免處於熱的環境，本劑會抑制發汗因而會引起發燒與中暑。
 5. 過量之治療：立即胃灌腸，靜脈注射Physostigmine 0.5~2mg，總劑量勿超過5mg；由直腸灌入2% Sodium Thiopental或Chlorl Hydrate 2%溶液100~200ml；發燒的症狀治療，視情況需要而施以人工呼吸。
 6. 偶有眩暈，不安，心悸亢進，口乾，便秘，腹脹感，尿躊躇或滯留，皮膚發疹，散瞳，視覺模糊，減少發汗等副作用發生。
 7. 青光眼，重症肌無力，胃腸部份或完全阻塞，麻痺性腸阻塞，腸弛緩（尤其是年老或虛弱者），巨結腸，嚴重結腸炎，泌尿生殖器阻塞，心血管狀況不穩等症應避免使用。

※貯存方法：存放於避光、陰涼處所。

※包 裝：4~1000顆塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

※衛署藥製字第040424號，G-5511，Code No. T2101

正和製藥股份有限公司新營廠

台南縣新營市新工路23號(新營工業區)