

合成副腎皮質荷爾蒙劑


“強生” 倍樂寧 - R 錠

PELONINE-R TABLETS "JOHNSON" (Prednisolone製劑)


內衛藥製字第001807號

倍樂寧-R為副腎皮質荷爾蒙之合成劑，係Corticosteroid，對風濕症及抗炎症具有治療效果。

【組成及性狀】倍樂寧係將Hydrocortisone A環上之1及2位脫水素者，具有下列化學構造，其性狀為白色或淡黃色之結晶性粉末，於235°C熔融分解。



11β, 17, 21-Trihydroxypregna-1, 4-diene-3, 20-dione
一般名稱 Prednisolone



11β, 17, 21-Trihydroxypregna-4-ene-3, 20-dione
Hydrocortisone

本劑每錠中含有：Prednisolone.....5mg
Riboflavin.....0.1mg

【賦形劑】Corn Starch、Hydroxypropyl Cellulose L、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate

【適應症】風濕性疾患、支氣管氣喘、過敏性疾患、紅斑性狼瘡等。

【用法·用量】本藥須由醫師處方使用，本劑將普通一日之全投與量分為每餐後及就寢前4次或朝夕2次服用，症狀好轉後每隔2-3日將1日投與量減少2.5-5mg(1/2-1錠)作維持療法，若萬一再發時，漸次增量而抑制症狀。以下所述之用法用量係適應於各種疾患及其症狀程度之一般使用法，故仍應視個人差別及症狀之輕重加以適當之增減。

1. 風濕性關節炎：

初期投與量(抑制量)，重症：1日30mg(6錠)，其他：1日20mg(4錠)，普通本劑治療開始後3-4日症狀即應見好轉，若繼續初期投與量7日仍不見效時，應懷疑該症是否真性風濕性關節炎，症狀好轉後，將投與量每隔2-3日減少2.5mg(1/2錠)至適當量後為維持量，必要時與安靜療法、食餌療法、整形外科療法等合併治療亦無妨。

2. 風濕熱、風濕性心炎、骨關節炎等風濕性疾患：

使用法與風濕性關節炎之方法相同，視症狀之輕重，投與有效之最低量。

3. 支氣管氣喘：

投與風濕性關節炎治療略同量為抑制量，普通症狀於12-24小時內即可好轉，但如喘息發作停止後，勿立即休藥，而將1日投與量減少2.5-5mg(1/2-1錠)後改為維持療法，治療開始後3-4日，呼吸困難會消失，肺活量亦有顯著之增加。

4. 播種性紅斑性狼瘡：

一般於此種皮膚疾患，需要投與較大量，初期抑制量，普通使用量1日須30mg(6錠)以上。

【對各症之臨床應用】

1. 風濕性疾患

急慢性風濕性關節炎、風濕熱、風濕性心炎、骨關節炎、脊椎炎、乾癱性關節炎。

- 2.過敏性疾患
支氣管氣喘(尤其是重症支氣管氣喘)、Behcet's症候群，蕁麻疹。
- 3.各種皮膚疾患
播種性紅斑性狼瘡、結節性動脈周圍炎、皮炎、鞏皮症、尋常性天疱瘡、多形滲出性紅斑、中毒性皮膚炎、接觸性皮膚炎。
- 4.腎病症候羣
- 5.血液疾患
特發性血小板減少性紫斑病、好中球減少症、白血症。
- 6.眼科疾患
虹彩毛樣體炎、瀰漫性葡萄膜炎、手術後之炎症、周邊角膜潰瘍、角膜炎、過敏性結膜炎、春季卡他兒、Reiter氏症候羣、Meta疱疹性角膜炎(Metaherpetica)、脈絡膜潰瘍。

- 【注意事項】**
- 1.本劑雖具有較其他副腎皮質荷爾蒙劑有較強之作用，但並無其他副腎皮質荷爾蒙劑等之重大副作用，普通之初期投與量或維持量下，雖長期投與亦不起鈉及水之貯留，及鉀之損失，有時亦有Cortisone及Hydrocortisone療法常有之Moon-face(圓形臉)、輕度多毛症及不眠症。
 - 2.經長期療法後欲中止服用時，不可立即中止，必先漸減用量，最後中止投藥。
 - 3.雖無明顯之Cortisone長期療法時常引起之消化器潰瘍及增惡之發生但亦要小心，如有胃部異常感請投與制酸劑併用。
 - 4.活動性結核患者，不應使用本劑，結核以外之急慢性細菌感染症患者，投與本劑時，應先以抗生劑或化學療法劑抑制其感染，與Cortisone療法完全相同。
 - 5.對於蛋白質限制中之患者，本劑1日30mg之服用量下，僅有氮素損失，反之對於自由攝取蛋白質之患者，雖投與大量(每日50mg)亦無氮素損失，因此本劑服用中之患者，需要攝取充分之蛋白質。
 - 6.時有多幸症(Euphoria)及健康感之發生，但不像Cortisone及Hydrocortisone療法時厲害，但對於有精神病或感情不安者，投與本劑，應需十分之注意。
 - 7.對於糖尿病患者，需增加Insulin必要量，故需要有相同於Cortisone、Hydrocortisone服用時之注意。
 - 8.對急性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生藥劑以治療感染疾病。
 - 9.對消化管障礙如胃腸潰瘍患者務請特別注意。
 - 10.因主要副作用引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
 - 11.糖尿病患者使用時，請注意增加Insulin之用量。
 - 12.對於有精神病因素者多加注意。
 - 13.服用本劑期間請充分補充蛋白質。

【包裝】 2-1,000錠 塑膠瓶裝。



Code No. : I-22

強生化學製藥廠股份有限公司
JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區中和路四段77、79號
訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579
工廠電話：(02)22878405