

"培力" 匹井安 錠

Piramide Tablets "P.L."

【成分】 Each tablet contains Pyrazinamide 500mg

【賦形劑】 Lactose, Potato Starch, Pregelatinized Starch, Povidone K-30, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate

【適應症】 抗結核(肺結核病)。

【用法用量】 成人每次1~2錠或依每公斤體重給予20~35mg，劑量分成一天3~4次服用。
極量為每天3公克(6錠)本劑限由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 禁忌：有肝障害的患者。
2. 慎重投與：
 - a. 本人及雙親，兄弟有痛風發作的病歷或者是尿酸值上昇的患者。
 - b. 腎障害及疑似腎障害的患者。
3. 副作用：
 - a. 肝臟：有出現肝障害情況，若有肝機能異常時即予停藥。
 - b. 關節：有出現尿酸值上昇及痛風發作(關節痛)的症狀。
 - c. 血液：好酸球增多症的血液症狀。
 - d. 過敏症：有發熱、發疹等過敏症狀出現時應予停藥。
 - e. 胃腸：食慾不振、噁心嘔吐等症狀。
 - f. 其他：頭痛、筋肉痛、色素沈著等。
4. 相互作用：併用其他藥劑容易引起肝障害應予十分注意。

【包裝】 100錠、500錠、1000錠瓶裝。

委託者：培力國際醫藥股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路13號1樓

電話：04-23581516(代表號)

製造廠：培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576(代表號)