

“應元” 保樂爽 5 毫克錠 (培尼皮質醇)

Prednisolone 5mg Tablets “Y.Y.”

【成分】 Each tablet contains:

Prednisolone.....5mg

賦形劑：

Lactose, Starch, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Pregelatinized starch, Tartrazine, Magnesium stearate, Alcohol, Purified water。

【作用】

本品為合成之副腎皮質荷爾蒙，為人類維持生命所必須之內分泌物。其作用有

- 1.糖新生作用：即使使蛋白質變為糖質，增加動物澱粉之貯蓄，增高血糖值。
- 2.消炎作用：能使局部的炎症消除，其作用認為是直接作用於毛細血管而令炎症患部消炎。
- 3.抗過敏作用：副腎皮質荷爾蒙、能緩和過敏症狀。

【適應症】

風濕性關節炎、皮膚炎、支氣管氣喘、藥物過敏、蕁麻疹、腱炎痛、風濕疹、乾癬、肉芽腫、重症性火傷。

【用法用量】

一回 5mg (1 錠)，1 日 3 回。

本藥須由醫師處方使用

【副作用】

感染症增惡、副腎皮質機能降低、消化性潰瘍、浮腫、高血壓、精神障礙、糖尿、骨疏鬆症、血栓性靜脈炎、滿月樣顏貌、犀牛角。

【注意事項】

- (A) 急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
- (B) 對消化管障礙如胃腸潰瘍患者務請特別注意。
- (C) 因主要副作用為引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
- (D) 糖尿病患者使用時，請注意增加 Insulin 之用量。
- (E) 對於有精神病因素者多加注意。
- (F) 服用本劑期間請充分補充蛋白質。

【貯存】

請置於 25°C 以下貯存。

【包裝】

6~1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。



應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL：(06) 2654883 (代表號)