

"培力"匹井梭安錠500毫克

Pyrazinamide Tablets 500mg "P.L."

- 【**作用**】本品主成分Pyrazinamide對人型結核菌H37Rv最小發育阻止濃度(MIC)為200ug/ml，與其他的抗結核劑有協力作用，經口投與在腸胃道吸收迅速，其代謝產物為pyrazic acid，通常2~5小時後達到最高血中濃度，若和其他抗結核劑併用，效果增加可提早改善症狀。
- 【**成分**】 Each tablet contains : Pyrazinamide 500mg
- 【**賦形劑**】 Lactose, Potato Starch, Pregelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Povidone K-30
- 【**適應症**】 肺結核及其他之結核症。
- 【**用法用量**】 1日3~4錠，1~3回分次服用(增減)，本藥需由醫師處方使用。

【**注意事項**】

1. 禁忌：有肝障害的患者。
2. 慎重投與：
 - a. 本人及雙親，兄弟有痛風發作的病歷，或者是尿酸值上昇的患者。
 - b. 腎障害及疑似腎障害的患者。
3. 副作用：
 - a. 肝臟：有出現肝障害情況，若有肝機能異常時即予停藥。
 - b. 關節：有出現尿酸值上昇及痛風發作(關節痛)的症狀。
 - c. 血液：好酸球增多症的血液症狀。
 - d. 過敏症：有發熱、發疹等過敏症狀出現時應予停藥。
 - e. 腸胃：食慾不振、噁心、嘔吐等症狀。
 - f. 其他：頭痛、筋肉痛、色素沈著等。
 - g. 高齡者之投與：一般高齡者生理機能低下，患者之狀態須慎重觀察，小心投與。
4. 相互作用：併用其他藥劑容易引起肝障害應予十分注意。

- 【**儲存**】 25°C以下，於原包裝儲存。
- 【**包裝**】 6~1000錠瓶裝。



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576 (代表號)

傳真：04-23590992