

5.2 * 11

【成分】：每毫升(ml)含有
有效成分及含量：di-Methylephedrine Hydrochloride.....1.0 mg
 Chlorpheniramine Maleate...0.1 mg
 Glyceryl Guaiacolate.....5.0 mg
其他成分(賦形劑)：Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Sodium Benzoate, Methylparaben, Sucrose, Aspartame, Allura Red AC, Brilliant Blue FCF, Grape Flavour, Water Purified

【用途(適應症)】：緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)

【不得用族群】：曾因本藥成分引起過敏的人。苯酮尿症的人，因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。

【用法用量】：成人及12歲以上，每次20毫升，一日3次；9歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2(10毫升)；6歲以上未滿9歲，適用成人劑量1/3(6.7毫升)；6歲以下，請洽醫師診治。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品
 衛署藥製字第040833號

LOT: _____
 EXP: _____

晟德大藥廠股份有限公司
 CENTER LABORATORIES INC. 新竹縣湖口鄉實踐路2號
 諮詢專線：(02) 2655-8680

“晟德” 息咳寧糖漿
 Secorine Syrup
 葡萄口味
 “Center”



品名:晟德息咳寧糖漿
 諮詢專線:(02)2655-8680

葡萄口味 “晟德” 息咳寧糖漿Secorine Syrup “Center” 綜合感冒劑 衛署藥製字第040833號

【成分】：每毫升(ml)含有
有效成分及含量：di-Methylephedrine Hydrochloride.....1.0 mg
 Chlorpheniramine Maleate...0.1 mg
 Glyceryl Guaiacolate.....5.0 mg
其他成分(賦形劑)：Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Sodium Benzoate, Methylparaben, Sucrose, Aspartame, Allura Red AC, Brilliant Blue FCF, Grape Flavour, Water Purified

【用途(適應症)】：緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：
 (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 (2) 苯酮尿症的人，因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 (1) 6歲以下。
 (2) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
 (3) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
 (4) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
 (5) 有心臟病及65歲以上的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
 (3) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
 4. 其他使用上注意事項：
 (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 (2) 避免陽光直射。
 (3) 勿超過建議使用量。因高劑量會產生焦慮、暈眩、或失眠，兒童可能會產生躁動。
 (4) 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
 (5) 不要服用本藥超過七日。
 (6) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
 (7) 不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】：


年齡	每次用量
成人及12歲以上	20毫升，一日3次
9歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2(10毫升)
6歲以上未滿9歲	適用成人劑量之1/3(6.7毫升)
6歲以下	請洽醫師診治

【警語】：1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：
 2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 (1) 若有任何不適情形產生。
 (2) 咳嗽持續達一星期以上，或高燒、腹瀉、疹子或持續性頭痛。
 (3) 症狀沒有改善，或症狀還伴隨發燒，或發燒持續三日。
 (4) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存】：請密封儲存於25℃以下，不須冰存。
 晟德大藥廠(股)公司(新竹廠)
 公司地址：臺北市南港區區區街3之2號7樓
 製造廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號
 諮詢專線：(02)2655-8680

【包裝】：20-4000毫升塑膠瓶裝

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。



品名:晟德息咳寧糖漿
 用途(適應症): 緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。
 用法用量:
 成人及12歲以上每次20毫升，一日3次
 9歲以上未滿12歲適用成人劑量之1/2(每次10毫升)
 6歲以上未滿9歲適用成人劑量之1/3(每次6.7毫升)
 6歲以下請洽醫師診治
 劑型與特徵: 糖漿: 紫色葡萄味
 諮詢專線:(02)2655-8680