



“永信”

司樂舒

口服液

SlipFeel Oral Saline Laxative “Yung Shin”

【作用理論】

鹽類緩瀉劑能增加水份滯留於小腸，因而促進排便功能。

【成分】

每mL中含：(每mL含鈉111.3 mg)
Monobasic sodium phosphate (monohydrate) 480 mg
Dibasic sodium phosphate (heptahydrate) 180 mg

【賦形劑】

Glycerin、Sodium Benzoate、Sodium Saccharin、Lemon-Ginger Flavo、Purified Water。

【適應症】

緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

【用法用量】

緩瀉劑

當作緩瀉劑緩解偶發性便秘，劑量及使用方式如下表：
除非醫師建議，請勿使用過量（見警語）。每次服用不可超過45 mL且儘可能多喝水以補充因瀉下所流失的水份。

服用量及方式：

年齡 (歲)	步驟1	步驟2	24小時最大劑量
成人、12歲以上	15 mL本藥加入一杯約240 mL冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約240 mL冷飲或水	45 mL
10&11歲	15 mL本藥加入一杯約240 mL冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約240 mL冷飲或水	15 mL
5~9歲	7.5 mL本藥加入一杯約240 mL冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約240 mL冷飲或水	7.5 mL
5歲以下	不可使用	不可使用	不可使用

* 24小時內服用量勿超過上表所示劑量

醫療程序前清腸

依醫師指示使用本產品作為清腸劑前，請確定醫師了解您的身體狀況及本產品的警語。服用劑量請以醫師建議劑量為主，並額外多補充清流液體以補充因瀉下所流失的水份—最少240 mL。
服用劑量：每次清腸使用二次30 mL或45 mL之本藥，兩次劑量服用間隔為10~12小時。

每次服用方式：

年齡 (歲)	步驟1	步驟2
成人、12歲以上	30~45 mL本藥加入一杯約240 mL冷飲或水中，喝下	至少再喝3杯約720 mL冷飲或水
10&11歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5~9歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5歲以下	不可使用	不可使用

本藥須由醫師處方使用。

【警語】依文獻刊載

- 24小時內之服用劑量若超過建議劑量，可能引起傷害。
- 請勿使用於鬱血性心臟衰竭、腎臟疾病或5歲以下小孩。
- 懷孕、授乳、限鈉飲食或有任何醫療狀況者，請詢問過醫師後再使用。
- 若您正服用處方或非處方藥品，請先詢問過醫師或藥師後再使用。
- 若您有腹痛、噁心、嘔吐、排便習慣改變持續2個禮拜、已經服用其他瀉劑治療便秘超過1禮拜，請先詢問過醫師後再使用。
- 若您直腸出血、服藥後6小時腸未蠕動或出現脫水現象時，請停止使用並詢問您的醫師。早期脫水症狀包括嘔吐、眩暈或尿量比平常少，這些症狀也許是嚴重問題的徵兆（此時請大量補充水份）。
- 請存放在孩童不易取拿之處。如果過量或意外服用，必須立刻求助醫護協助。

【不良反應】依文獻刊載

電解質失衡、急性磷酸鹽腎病 (Acute phosphate nephropathy)、紅疹及搔癢...等不良反應。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【其他資訊】依文獻刊載

本產品不含任何糖份。
一般在服用後30分鐘至6小時會產生排便（視服用劑量不同而不同）。
放入冰箱冷藏可增加口感，但不可冷凍。

【包裝】

45~4000毫升塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號