



抗微生物劑

SYT5-001  
衛署藥製字第045276號  
Code No.:38317

# 雙合黴素

膜衣錠 625公絲

## Soonmelt® Film Coated Tablets 625mg

【類別】本藥須由醫師處方使用。

【成分】每膜衣錠中含：

Amoxicillin (as Trihydrate) ..... 500mg(potency)  
Clavulanic acid (as Potassium salt) ..... 125mg

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。

【說明】

Soonmelt是一種廣效性的抗生素製劑，它對於一般診所及醫院中所常見的細菌病原體都有效。Clavulanate的β-lactamase抑制作用將Amoxicillin的抗菌譜擴展至更大範圍的微生物，包括許多對其他β-lactam抗生素具抗藥性的微生物。

Soonmelt口服製劑為每日服用二次的給藥設計，它可使用於下列部位細菌感染的短期治療：

上呼吸道感染（包括耳鼻喉），例如扁桃腺炎、鼻竇炎、中耳炎等。

下呼吸道感染，例如急性與慢性支氣管炎、肺葉性及支氣管肺炎。

生殖、泌尿道感染，例如膀胱炎、尿道炎及腎盂腎炎。

皮膚及軟組織感染，例如癤、膿瘍、蜂窩組織炎及創傷感染。

骨及關節感染，例如骨髓炎。

牙科感染，例如牙槽膿腫。

其他的感染，例如敗血症性流產、產後敗血病、腹內性敗血病。

Soonmelt是一種廣效性的殺菌劑，其有效的微生物包括：

格蘭氏陽性菌

需氧菌：Enterococcus faecalis、肺炎鏈球菌(*Streptococcus pneumoniae*)、膿膿鏈球菌(*Streptococcus pyogenes*)、草綠色鏈球菌(*Streptococcus viridans*)、\* 金黃色葡萄球菌(*Staphylococcus aureus*)、\* 凝固酶陰性葡萄球菌（包括表皮葡萄球菌(*Staphylococcus epidermidis*)）、棒狀桿菌(*Corynebacterium species*)、炭疽桿菌(*Bacillus anthracis*)、單核細胞增多性李斯特氏桿菌(*Listeria monocytogenes*)。

厭氧菌：梭菌屬細菌(*Clostridium species*)、膿球菌(*Peptococcus species*)、膿鏈球菌(*Peptostreptococcus*)。

格蘭氏陰性菌

需氧菌：\* 流行性感冒桿菌(*Haemophilus influenzae*)、\* 大腸桿菌(*Escherichia coli*)、\* 奇異變形菌(*Proteus mirabilis*)、\* 普通變形菌(*Proteus vulgaris*)、\* 克雷白桿菌(*Klebsiella species*)、\* 卡它莫拉克氏菌(*Moraxella catarrhalis*)、\* 沙門桿菌(*Salmonella species*)、\* 志賀桿菌(*Shigella species*)、百日咳桿菌(*Bordetella pertussis*)、布氏桿菌(*Brucella species*)、\* 淋病奈瑟菌(*Neisseria gonorrhoeae*)、腦膜炎奈瑟氏菌(*Neisseria meningitidis*)、霍亂弧菌(*Vibrio cholerae*)、雞霍亂桿菌(*Pasteurella multocida*)。

厭氧菌：包括脆弱類桿菌(*B. fragilis*)在內的類細菌屬(*Bacteroides spp.*)。

\* 具有能製造beta-lactamase的變種，能對Ampicillin及Amoxicillin產生抗藥性。

【劑量及用法】

治療感染的一般劑量

成人與12歲以上的兒童

輕度至中度感染：Soonmelt 625公絲錠劑一顆，每日服用二次

治療的方式可先以注射的方式開始給藥，再改以口服的方式繼續給藥。

牙科感染的劑量（例如牙槽膿腫）

成人與12歲以上的兒童：Soonmelt 625公絲錠劑一顆，每日服用二次，連續使用5天。

Soonmelt 625公絲錠劑並不建議使用於12歲以下的兒童。

腎功能受損病人的使用劑量

成人：

輕微受損 (肌胺酸清除率 >30毫升/分鐘)	中度受損 (肌胺酸清除率在 10~30毫升/分鐘)	重度受損 (肌胺酸清除率 <10毫升/分鐘)
劑量不變(625毫克 一錠，每日服用二次)	一顆625毫克錠劑， 每日二次。	每24小時內不可使用 超過625毫克之錠劑

肝功能受損病人的使用劑量

需謹慎給藥，並定期進行肝功能監測。

口服給藥

錠劑需整顆吞服，不可咀嚼。如有需要可將錠劑分開成兩半以利吞服，但不可咀嚼。

為了將此藥物對腸胃所造成的不適降至最低，應於用餐開始時服用。此藥在用餐開始時服用可得到最佳吸收效果。

如未重作評估，此藥之使用不可持續超過14天。

