

“信東”
舒鼻適 複方糖漿
Spiz Syrup

【產品概說】

Spiz 適用於解除上呼吸道之不適症狀。上呼吸道不適症狀例如：過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎；感冒及流行性感冒。

【成分】

有效成分及含量：每 mL 含有：

Pseudoephedrine Hydrochloride 6mg

Triprolidine Hydrochloride 0.25mg

其他成分（賦形劑）：Sugar White、Methylparaben、Glycerin、Tartrazine、Sodium Hydroxide、Alcohol 95%、Propylparaben、Citric Acid Hydrous、Essence Pineapple FV8212、Purified Water。

【用途（適應症）】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (2) 服用單胺氧化酶抑制劑（MAOI）的人，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用的藥品是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 6 歲以下。
 - (2) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
 - (3) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
 - (4) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 65 歲以上。
 - (3) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
 - (4) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
4. 其他使用上注意事項：
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。
 - (3) 勿超過建議使用量。
 - (4) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
 - (5) 不得與酒精性飲料併用。
 - (6) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

成人及 12 歲以上	每天 3~4 次，每次 10mL 糖漿，每次間隔 4 小時以上服用。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
6 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【藥物交互作用】

Spiz 與其他交感神經樣例如去充血劑、三環抗鬱抑制劑、食慾抑制劑及安非他命類精神刺激劑併用，或與會干擾交感神經樣胺類分解代謝之單胺氧化酶併用，可能偶而會引起血壓上升，由於 Spiz 含有 Pseudoephedrine 可能會部分會扭轉一些干擾交感活性藥物之降壓作用，這些藥物包括 Breylium，Bethanidine，Guanethidine，Debrisoquine，Methyldopa，Alpha 及 Beta 交感神經阻斷劑。（見使用上注意事項）

【副作用】

可能有中樞神經系統抑制作用或興奮作用，思睡之報告最常見。曾有睡眠障礙及幻覺報告但極少見。偶有刺激性及無刺激性之皮疹、心悸、口、鼻及喉嚨乾燥之報告。服用 Pseudoephedrine 男性偶有尿滯留報告，前列腺腫大可能是尿滯留之重要罹病因素。

中毒及服用過量之治療：Spiz 急性中毒症狀包括思睡、疲勞、頭暈、運動失調、無力、低緊張度、呼吸抑制、皮膚及黏膜乾燥、心悸、高血壓、過熱、暴躁、痙攣及排尿困難。必須採取維持及支持呼吸和控制痙攣之措施。若需洗胃應在吞食後，可能需要膀胱插管。若有必要，可以酸性利尿作用或透析以加速 Pseudoephedrine 之排出。

【包裝】

60~4,000 毫升，塑膠瓶裝。

【保存條件】

放置於 25℃ 以下，避光。
請勿變換容器，避免誤服，均可保存品質。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第 042267 號
諮詢專線：0800-231525

50101021 ④



委託者：信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路 22 號
製造廠：榮民製藥股份有限公司
桃園市中壢區中山東路三段 447 號