

"生達"胃必康 錠

Stacaine Tablets "Standard"

衛署藥製字第 029355 號 G-0496 Code No.TS-16 2211900


胃必康含有胃粘膜局部麻醉劑 Sulcain 及緩衝型制酸劑 Polymagal 二種有效成份，以適當比例加以配合，發揮其協同作用，因此對於急、慢性胃炎所伴隨之種種症狀，如胃痛、胃灼熱、胃酸過多、胃部不適(除低酸性胃炎及無酸性胃炎)等，療效迅速，幾無副作用，為一理想之胃病治療劑。

「成分」：每錠含

Sulcain	100mg
Polymagal	100mg

「藥理作用」：

1. Sulcain



(1) 局部麻醉作用

根據使用青蛙和兔子之動物實驗結果顯示，Sulcain 具有和 Polymagal 同程度之浸潤麻醉作用及表面麻醉作用。

(2) 鎮痙作用

Sulcain 可抑制由 Acetylcholine 及鋇所引起之體外腸管收縮，並可拮抗 Neostigmine 誘發之小腸痙攣，兩作用相輔而迅速緩解消化道運動之異常亢進及抑制胃酸過度分泌。

(3) 其他作用

Sulcain 對唾液分泌抑制，散瞳及降低血壓作用微弱。

2. Polymagal:係一種以特殊方法製造而成之緩衝長效型制酸劑。

(1)於胃粘膜表面可吸著胃酸及胃蛋白酶。

(2)強力而迅速的制酸能力與持久的緩衝作用，服用數小時後，使胃內 pH 值維持於安全且適當的 pH 範圍 (Ph3~5)。

(3)不引起鹼性過高及酸反激(acid rebound)之現象。

(4)Polymagal 具鋁鎂氫氧化合物之優點，而無單獨存在之缺點，因此服用後無腹瀉、便秘之虞。

「臨床效果」：

對急、慢性胃炎為主之消化道疾患，投予 Stacaine 1 次 2 錠，1 日 3~4 次，得良好療效，即 382 例中有效者有 329 例(有效率 86.1%)。尤其對心窩部疼痛、嘔氣、咽喉狹窄感等症狀，在短時間內即可被改善，並且對副交感神經遮斷劑無效之症例亦顯示有效。

「適應症」：

急、慢性胃炎、胃痛、胃灼熱、胃酸過多、胃部不適感。

「用法用量」：

通常成人 1 次 2 錠，1 日服用 3~4 次，依年齡症狀酌情增減。

本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」：

- 服用本品時為避免在口中殘留而有麻痺感，應注意勿咬碎而儘快服下。
- 使用本劑時若發現有過敏宜停藥。

「包裝」：

6~1000 粒以下盒瓶裝。



GMP 藥廠 ISO9001

生達化學製藥股份有限公司

臺灣省台南縣新營市土庫里六號之二十