

消化酵素製劑  
**"生達" 速泰消** 膜衣錠  
**Stazyme** F.C. Tablets "Standard"

本品為消化酵素劑，錠劑之子錠(含Lipase及Prozyme)包有腸衣，使其只有小腸內溶解，以保其有效成分不致被胃酸所破壞，在母錠(含Biodiastase及Cellulase)則包有胃溶性薄膜，使其能在胃中溶解而發揮其優良的效果。

本品含有脂肪酵素、澱粉酵素及蛋白酵素，能分解脂肪、澱粉及蛋白質，使之易為腸胃所吸收，並含有纖維分解酵素，能消化日常蔬菜類之食品，因此本品可供給主要之消化酵素，幫助不健全之消化，以分解各種日常食用之食物。

本品可緩解因消化不良而發生之症狀。

**【成分】**

有效成分及含量：本品每錠含有：

**Biodiastase 2000**.....8000units (20mg)  
**Cellulase AP3**.....300units (10mg)  
**Lipase AP6**.....900units (15mg)  
**Prozyme 6**.....300units (5mg)

其他成分(賦形劑)：

Lubric Wax (101)、Lactose、Cellulose Acetate Phthalate、Diethyl Phthalate、Acetone、Alcohol 95%、Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Potato Starch、Povidone K-30、Hydroxypropylmethylcellulose、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol 4000、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、Purified Water

**【用途(適應症)】**：幫助消化

**【使用上注意事項】**

- 一、有下列情形者，請勿使用。  
 (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治。  
 (一)3歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。  
 (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項  
 (一)為防止兒童誤食請妥善保管。  
 (二)避免陽光直射。  
 (三)勿超過建議使用量。  
 (四)藥品應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。

**【用法用量】**：

年齡	使用劑量	使用次數
成人及12歲以上	每次1-2錠	一天3至4次，或需要時服用，
6歲以上未滿12歲	每次1錠	應整粒吞服，不得剝半或嚼碎

**【警 語】**

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

**【包裝】**：6-1000錠鋁箔盒、塑膠瓶裝

**【類別】**：醫師藥師藥劑生指示藥品

**【貯存】**：25°C以下儲存。

衛署藥製字第019353號

Code No. TS-09 2211750

20170801



PIC/S GMP藥廠  
**生達化學製藥股份有限公司**  
 STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.  
 台南市新營區土庫里土庫6之20號