



“瑞士”

# 瑞胃得 膜衣錠300毫克 (希每得定)

Stogamet F.C. Tablets 300mg "SWISS" (Cimetidine)

Stogamet 係組織胺 $H_2$ -感受器之拮抗劑，是第一個臨床應用於治療消化性潰瘍成功之新藥。雖不具抗胆鹼作用，但却可抑制胃酸的基礎分泌，或由組織胺(Histamine)、胰島素(Insulin)、胃泌素(Gastrin)、咖啡鹼(Caffeine)、食物(food)、迷走神經(Vagalnerve)引起之胃酸分泌。故與現有任何療法之作用方式迥然不同。

## 【特點】

- 1.對胃酸分泌的抑制具有實質的功效及意義。
- 2.治療初期即有顯著的症狀改善現象。
- 3.高度的治療率突破傳統的治療。只需短期治療，潰瘍即能迅速癒合。
- 4.可促進胃粘膜之完整性而增加抵抗力。
- 5.可立即控制消化性潰瘍併發之大出血，並有效的預防再出血。
- 6.經證實為臨床上第一個能控制 Zollinger-Ellison 症候群之藥劑。
- 7.廣泛的臨床研究，發現幾乎沒有副作用及任何臨床禁忌。
- 8.低劑量長期治療六個月，癒後復發率減為5%以下。
- 9.自問世兩年以來，使得需開刀之胃及十二指腸潰瘍患者減少50%以上。

## 【成分】


Each F.C. Tablet contains :

Cimetidine ..... 300 mg

## 【賦形劑】

Lactose、Starch、Povidone K-30、Magnesium Stearate、Primojel、Sepifilm LP-770、PEG 6000、Tartazine Aluminum Lake、Aluminum Lake Blue No. 1、Indigo Carmine Aluminum Lake

## 【化構式】



1-cyano-2-methyl-3-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio) ethyl] guanidine

## 【藥理】

消化性潰瘍之病因是由於胃酸過多，故有“無酸即無潰瘍”之說。這是因為若沒有胃酸存在，則酸無法直接侵蝕胃壁，而且由於 pH 值提高，可不活化胃蛋白酶(Pe-psin)，因此即使在組織防禦力減弱的情況下，也無法形成潰瘍。

因為胃酸是經由“共同途徑(Common Pathway)”所分泌，而組織胺(Histamine)是此途徑中的調節物質(Media-tor)，故成為已知物質中強力的胃酸分泌促進劑，而 Stogamet 能直接阻斷 Histamine 在胃壁細胞上之 $H_2$ -接受體( $H_2$ -receptor)的作用，故可完整有效的減低基礎胃酸分泌及刺激引起之胃酸分泌而達到下列效果。

- 1.24小時持續性抑制胃酸分泌。
- 2.大幅提高胃內 pH 值，使維持在 pH 5.0 以上。

## 【適應症】

十二指腸潰瘍、胃潰瘍、消化性食道炎、上胃腸道糜爛或潰瘍引起之出血、再發性潰瘍、穿孔性潰瘍、膽囊纖維變性併發有胰臟功能不全時之補助療法。

## 【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

良性胃潰瘍及十二指腸潰瘍：

錠劑：睡前服用2片或是早、晚各服1片，即使症狀已經消除，仍須繼續服用4-6週。

Zollinger-Ellison 症候群：

一日4次，每次1片，偶而增加至一天2.4克。

逆流性食道炎——一日4次，每次1片(三餐及睡前)維持4-8週，因本品可能無法即時使症狀消除，故開始治療時，可與制酸劑合用至症狀消除後，再繼續單獨以 Stogamet Tablet 治療。若症狀沒有明顯改善，可酌情增加劑量，最大用量為每天2.4公克，癒後可續以維持量(每日睡前服用2片或早晚各服一片)治療以防止復發。

## 【注意事項】

### 1. 一般注意事項：

- (1) 以本劑治療之症狀反應，不能排除胃癌發生之可能。
- (2) 具其它嚴重疾病患者，高齡患者(50歲以上)肝、腎疾病患者使用本劑，可能會發生一些可逆性之生理混亂狀態(參考副作用)，嚴重者，停藥後可恢復正常。

### 2. 藥物交互作用：

本劑經由肝臟微粒體酶系統之作用，會降低肝臟對 Warfarin-type 抗凝血藥，phenytoin、propranolol、nifedipine、chlordiazepoxide、diazepam、tricyclin antidepressants、lidocaine、theophylline 和 metronidazole 等藥之代謝，延緩上述藥物之排除，及增加其血中濃度。

### 3. 孕婦：除非必要，勿使用本劑。

### 4. 授乳婦：本劑會分泌於乳汁中，故除非必要，勿使用本劑。

### 5. 孩童：16歲以下之孩童勿使用本劑。

### 6. 對本劑已知會過敏者，請勿使用本劑。

副作用：1. 偶有下痢、紅疹、頭痛、眩暈。

2. 少見的男性女乳，嗜中性白血球減少，過敏反應，心跳過慢，但停藥後均可恢復正常。

## 【儲存條件】

25°C以下避光儲存。

## 【包裝】

4-1000粒塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新市廠：台南市新市區中山路182號