

# 仿單標籤粘貼表

產品名稱	“生達”舒腦膠囊 10 毫克	申請廠商	生達化學製藥股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字 第 029575 號		



“生達”舒腦膠囊 10 毫克  
(服納利林)

**Suzin** Capsules 10mg "Standard"  
(Flunarizine)

【成分名】Flunarizine

【主成分】

Each capsule contains:

Flunarizine 2HCl ..... 11.8mg  
(equivalent to flunarizine..... 10mg)

【臨床藥理】

Flunarizine 為一選擇性的鈣離子阻斷劑，能防止細胞內鈣離子之過份負荷，但不影響心臟及血管平滑肌細胞之正常鈣離子通路。Flunarizine 從消化道吸收良好，大部份由肝臟代謝，其代謝物經由膽汁從糞便中排泄。

【適應症】

噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

一般成人劑量：

預防暈車、暈船：旅遊前服用 10 mg。

一般兒童劑量：劑量尚未確立。

【注意事項】

1. 很少患者會於本藥治療期間發生疲倦且逐漸嚴重的現象，若此情形發生，須停止用藥。

2. 不可超過建議服用劑量，長期維持劑量之患者，須定期回診檢視，以便即早發現錐體外症狀及抑鬱等症狀而停止用藥。而若發現治療效果逐漸不明顯，亦須停藥。

3. 於人類懷孕期間使用本藥之安全性報告尚未建立。於動物研究顯示，本藥對懷孕各過程或現象（包括對胚胎或胎兒，受孕之過程，產前或產後發育）不產生直接或間接之副作用。

4. 本藥可從狗乳汁中分泌出，且 Flunarizine 於乳汁中之濃度高於血漿，目前尚無 Flunarizine 於人體乳汁中分泌之數據，但仍不建議授乳期之婦女使用本藥。

5. 過量：

基於 Flunarizine 藥理學上之特性，在過量下嗜睡及無力感應當會出現，很少有急性過量的現象被報告，曾有一次服用 600mg，其症狀為嗜睡，紊亂及心悸。Flunarizine 沒有特殊之解毒劑，其處理方式為輔助療法，包括服用活性炭、洗胃或嘔吐。

6. 開車或操作機械：

由於會產生嗜睡現象，特別是在治療之初，所以需要駕車或操作危險機械的患者服用本劑時應小心。

7. 禁忌：

有抑鬱病史之患者，或目前有帕金森氏症之患者，及其他錐體束外異常之患者。

【相互作用】

當本藥與酒精、安眠藥，或鎮靜劑合用時會產生過度鎮靜現象。本藥未發現與 Beta-blocker 產生配合禁忌。



25211

主成分：

Each capsule contains:  
Flunarizine 2HCl..... 11.8mg  
(equivalent to flunarizine... 10mg)

適應症：

噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

用法用量：

一般成人劑量：

預防暈車、暈船：旅遊前服用 10 mg。

一般兒童劑量：劑量尚未確立。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字第 029575 號

G-0601

1000粒瓶裝

**Suzin** Cap. 10mg  
(Flunarizine) "Standard"

Active ingredient : Each cap. contains:  
Flunarizine 2HCl..... 11.8mg  
( equivalent to Flunarizine.... 10mg)

Indication:

Nausea, vertigo, labyrinthine disorder, motion sickness and peripheral vessel circulation disorder.

Usage, Dosage and Caution:  
Take the drug after reading written instruction carefully.

The use of this drug should be prescribed by a Physician.

Lot :

Exp :

12

210

主成分：

Each capsule contains:  
Flunarizine 2HCl..... 11.8mg  
(equivalent to flunarizine... 10mg)

適應症：

噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

用法用量：

一般成人劑量：

預防暈車、暈船：旅遊前服用 10 mg。

一般兒童劑量：劑量尚未確立。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

請詳閱說明書後使用。

衛署藥製字第 029575 號

G-0601

1000粒盒裝

**Suzin** Cap. 10mg  
(Flunarizine) "Standard"

Active ingredient : Each cap. contains:  
Flunarizine 2HCl..... 11.8mg  
( equivalent to Flunarizine.... 10mg)

Indication:

Nausea, vertigo, labyrinthine disorder, motion sickness and peripheral vessel circulation disorder.

Usage, Dosage and Caution:  
Take the drug after reading written instruction carefully.

The use of this drug should be prescribed by a Physician.

Lot :

Exp :

S0112



衛署藥製字第 029575 號

10 毫克 申請廠商 生達化學製藥股份有限公司

單標籤粘貼表

**【副作用】**

最常見的副作用為嗜睡或疲倦，但都是暫時性的，以及體重增加或食慾增加。

下列為於慢性治療期間可能發生較嚴重之副作用：

抑鬱--尤其是有抑鬱病史之女性患者，其危險性更高。

錐體束外的症狀--如運動遲鈍、靜坐不能，口部及顏面運動困難、震顫，年紀較大者危險性較高。

較少發生之副作用有：

消化系統--胸口灼熱、噁心、胃痛。

中樞神經系統--失眠、焦慮。

其他--口乾、肌肉痛、皮膚發紅。

**【賦型劑】**

Lactose Spray Dried、Colloid Silicon Dioxide、Sodium Stearyl Fumarate  
Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Brilliant Blue FCF  
New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine

**【包裝】**

2~1000粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

**【貯存】**

25°C以下，避光貯存。

置於兒童不及之處。

衛署藥製字第029575號 G-0601 Code No. CS-06 2215210

藥商 PIC/S GMP藥廠  
生達化學製藥股份有限公司  
台南市新營區土庫里土庫6之20號

製造廠



PIC/S GMP藥廠  
生達化學製藥股份有限公司二廠  
台南市新營區開元路154號



(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

註

**Suzin**  
"Standard"  
Capsules 10mg  
(Flunarizine)

3715212

100Cap.

**Suzin** Capsules 10mg  
"Standard" (Flunarizine)



ISO 9001  
**STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.**  
MAIL ADD: P.O. BOX 74 Xinying  
Tainan City 73099 Taiwan

成分：每粒含  
Flunarizine 2HCl.....11.8mg  
(equivalent to flunarizine.....10mg)  
適應症：  
噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。  
Lot：  
Exp：

3715212

100粒

“生達” **舒腦**  
膠囊10毫克（服納利林）

藥商：  
PIC/S GMP 藥廠  
**生達化學製藥股份有限公司**  
台南市新營區土庫里土庫6之20號



製造廠：  
PIC/S GMP 藥廠  
**生達化學製藥股份有限公司二廠**  
台南市新營區開元路154號

“生達” **舒腦**  
膠囊10毫克（服納利林）

S0109

用法用量：請詳閱說明書  
本藥須由醫師處方使用。  
注意事項：請詳閱說明書後使用。  
衛署藥製字第029575號 G-0601