

"信東" 欣得眠 膠囊 30 公絲 / 15 公絲 (鹽酸氟路洛)

Syndoman Capsules 30 mg / 15 mg "S.T." (Flurazepam Hydrochloride)

**【成分】**

每粒膠囊中含：

Flurazepam Hydrochloride ..... 30 mg  
15 mg

**【性能】**

在動物實驗中，此藥可提高對扁桃體和視丘刺激的覺醒閥，並且減低電刺激下視丘的感度反應。對於人體，此藥可縮短睡眠潛伏期，減少覺醒週期，因而增加睡眠時間。通常病人服藥後 20 分鐘內即可入睡，並能維持睡眠 7~8 小時。

**【適應症】**

失眠。

**【用法・用量】**

因欣得眠可治各種型態之不眠症，劑量可依個別之症狀而調整，通常劑量是在 15~60mg 之間。一般成人劑量是睡前服用 30 mg，老年人及體弱者，開始劑量是 15 mg，再視其個別反應酌量遞加。

本藥須由醫師處方使用。

**【使用限制】**

依賴性(dependence)禁斷症狀(withdrawal)

在使用 benzodiazepine 類藥物之治療期時可能會產生依賴性，尤以下列患者較明顯如高劑量長期使用，患者先前有酒精中毒、藥物濫用、嚴重精神或人格異常等情形。為了減低依賴性的產生，投與欣得眠時必須審慎確認症狀並避免長期投與，如需長期投與時必須評估其治療利益及風險並做定期之治療監測。禁斷症狀的產生因人而異，可能從幾個小時到一週或更久，常見之症狀輕微者有戰慄、不安、失眠、焦慮、頭痛或精神不集中，有時盜汗，肌肉或下腹的痙攣、認知的異常等亦可能發生。精神錯亂或痙攣則罕見。

當禁斷症狀發生時，病人需進一步的醫療控制及治療，避免突然斷藥應逐漸減少劑量。

**【注意事項】**

欣得眠多跟其他安眠藥一樣，因個人的反應無法預測，服用期間必需避免喝酒。因劑量之改變和病人之敏感性而定，欣得眠可能影響病人之某些反應，如駕駛行爲能力等。欣得眠如與中樞神經藥物併用時例如：神經治療劑、鎮靜劑、抗憂鬱劑、止痛劑和麻醉劑等合併使用，則應注意該藥可增強鎮靜效果。

使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

**【包裝】**

2~1,000 粒玻璃瓶裝、鋁箔盒裝。

"信東"欣得眠膠囊 30 公絲 衛署藥製字第 042222 號 G-6293  
"信東"欣得眠膠囊 15 公絲 衛署藥製字第 042227 號 G-6279



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路 22 路

TS 018 ③