

降血脂藥
脂 淨 膠囊 100 毫克
Synpid Capsules 100 mg

【作用】

本品具有顯著的降血脂作用，能經由減少含於膽固醇之低密度脂蛋白(LDL)和含於三酸甘油酯之極低密度脂蛋白(VLDL)，而降低血清中之脂質。此外，本品會增加有益的高密度脂蛋白膽固醇(HDL)。Fenofibrate對極低密度脂蛋白比對低密度脂蛋白，似乎有較大的抑制作用。在治療劑量下，Fenofibrate會促進HDL膽固醇之提升，使總低密度脂蛋白膽固醇含量降低，及實質上使極低密度脂蛋白三酸甘油酯的含量降低。Fenofibrate能增加肝臟將膽固醇轉化為膽鹽之排泄，抑制三酸甘油酯之生合成，增加脂蛋白脂肪酶之活性而加速VLDL之分解代謝，且能經由調節HMG-CoA還原酶之活性，對膽固醇之生合成有抑制作用。因此本品具有多重降血脂作用，能有效的使各種高血脂症之脂質代謝障礙恢復正常。當 Fenofibrate和食物一起服用後，會迅速水解成活性代謝物 Fenofibric acid。本品若在禁食狀態下服用，則其吸收低且不穩定。本品和食物一起服用則會增加其吸收，主要經由腎臟排出，半衰期約為20小時，對於嚴重腎衰竭患者，會有顯著的蓄積作用，此可由其半衰期會顯著的增加而看出。因此，本品之劑量可能必須依其creatinine clearance之速率而減低。

【成分】每粒中含有

Fenofibrate 100 mg.

【適應症】

高脂質血症。

【用法・用量】

成人每日3粒，早餐時服用2粒，晚餐時服用1粒。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

1. 有嚴重肝、腎機能障礙(creatinine clearance < 20 mL/min.)之患者。
2. 膽囊疾病之患者。
3. 對Fenofibrate或其他Fibrate類藥物會產生過敏者。
4. 懷孕及哺乳：本藥不可使用於懷孕及哺乳之患者。

【注意】

1. 和抗凝血劑併用：本品和抗凝血劑併用時應特別注意，抗凝血劑之劑量應減少，使凝血時間維持在期望值，以避免出血之併發症。
2. 本品與Statins和Cyclosporine併用時，曾有發生嚴重肌肉炎和橫紋肌變性之報告，因此和這些藥品併用時應權衡其利弊。
3. 本品不可和MAO Inhibitor併用，因其可能會增加肝臟毒性的危險。
4. 本品可能會加強Sulfonylureas和Insulin的作用，但無低血糖症或低血糖反應之病例報告。
5. 懷孕：應嚴格控制生育計畫，若懷孕時則應立刻停藥。計畫懷孕之婦女，在懷孕前應先停藥數月。
6. 哺乳：因無關於Fenofibrate是否會分泌到人乳汁中之資訊，哺乳婦女不應使用本藥。

【副作用】

1. 胃腸道：上胃部痛、脹氣、腹痛、噁心、腹瀉、便秘。
2. 皮膚：皮膚發紅、搔癢、蕁麻疹。
3. 肌肉骨骼：肌肉痛和無力、關節痛。
4. 中樞神經系統：頭痛、暈眩、失眠。

【貯存條件】

貯存於乾燥處、25°C以下及兒童伸手不及之處。

【賦形劑】

Lactose, Pregelatinized Starch, Magnesium Stearate
Capsule(Gelatin, Titanium Dioxide, Sodium Lauryl Sulfate)

【包裝】

6 ~ 1000粒，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-6577 號
042826 號

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司

303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠：優良化學製藥股份有限公司

303新竹縣湖口鄉中興村光復路10號

SLT0221R-04