

"元宙" **腹消樂** 糖衣錠  
Talex Sugar Coated Tablets "Y.C."

衛署藥製字第048436號  
GMP G-9406

- 【成份】** Each S. C. tablet contains:  
Pancreatin 212.5 mg(相當於Amylase 6500 units、Lipase 8000 units、Protease 450 units(依據F.I.P))以及Metoclopramide HCl 5 mg。
- 【說明】** 本品可解除由胃腸運動及胰外分泌活性發生障礙引起的胃腸症狀，如；腹漲感、噯氣、噁心及胃部的緊張和壓迫感，Metoclopramide HCl可正常化胃及小腸的運動且可促進胃的排空，Pancreatin則可替代或補充胰酶的不足，促進食物的利用和吸收。
- 【適應症】** 消化器機能異常(噁心、嘔吐及腹部膨滿感)。
- 【用法用量】** 一天三次，每次一到二錠，餐時服用。  
本藥須由醫師處方使用。
- 【副作用】** 個別的情形—發生在小孩的較為顯著—Metoclopramide可能引起運動困難的症狀(錐體外效應，如頭、頸和肩等部位肌肉的痙攣、動眼危象)如有這種情形必須停止Talex的治療，靜脈注射Caffeine或biperiden (Akineton)可以迅速的除去痙攣，如停止治療，痙攣在數小時內即消失，鎮靜劑如diazepam (Valium)亦可使用，在較高的劑量下偶而有輕微的嗜眠及煩躁不安、溢乳現象。
- 【禁忌症】** 由於可能引起動運不能的症狀，Talex在給予14歲以下的小孩，特別是年紀較輕的小孩，必須有嚴格的指示。
- 【交互作用】** Talex不能與神經方面藥物一起使用，因其容易導致錐體外症狀的發生。解痙藥也可能減低Talex的效果。
- 【警語】** 使用含metoclopramide成分藥品可能造成遲發性運動障礙(tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，具分析本品之使用型態，約20%病人使用超過12週，故不建議長期(超過12週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生tardive dyskinesia之風險者。投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用metoclopramide藥品相關的不良反應如肌張力失調(dystonia)及錐體外路徑反應(extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。
- 【賦形劑】** Povidone K-30、Sodium bisulfite、Silicon dioxide、Magnesium stearate、Carboxymethylcellulose calcium、Acacia、Sucrose、Gelatin、Calcium phosphate dibasic、Talc、Yellow wax、Hydroxypropylmethylcellulose phthalate、Tartrazine。
- 【包裝】** 6-1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。
- 【儲存】** 25°C以下儲存。



元宙化學製藥股份有限公司  
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路272號  
TEL: (049) 2253190