

“優良” 優力黴素膠囊 (賜福力欣)

ULEXIN CAPSULES (CEPHALEXIN) 衛署藥製字第 016706 號

“優良” 優力黴素膠囊 500 毫克 (賜福力欣)

ULEXIN CAPSULES 500MG (CEPHALEXIN) 衛署藥製字第 022105 號

優力黴素(Cephalexin monohydrate)是一種口服半合成的廣效殺菌性頭芽孢菌素(Cephalosporin)抗生素。它的化學結構式是 7-(D- α -amino- α -phenylacetamido)-3-methyl -3-cephem-4-carboxylic acid monohydrate.

【藥理】

優力黴素在酸中很安定，所以在飯前或飯後服藥都不影響藥效，而且口服後吸收很快，如果服用 250mg 及 500mg 的劑量，一小時後可以測得的平均最高血中濃度分別為 9mcg/ml 及 18mcg/ml，服用六小時以後，仍舊可以測得顯著的血中濃度，服用後八小時，已經有 90% 以上的優力黴素以原形式未受破壞由尿中排出。如果服用 250mg 的劑量，在這八小時內的尿中最高濃度可達到 1,000mcg/ml。

【成分】 Each capsule contains:

Cephalexin.....250mg 及 500mg (base activity).

【適應症】

葡萄球菌，鏈球菌，肺炎雙球菌，腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【作用】

優力黴素對下列有感受性的細菌所引起的呼吸道、生殖泌尿道、骨骼、皮膚及軟組織等的感染有治療的效果。

乙種溶血性鏈球菌(Beta-hemolytic Streptococci)。

葡萄球菌(Staphylococci)包括凝固酶陽性(Coagulase-Positive)，凝固酶陰性 (Coagulase-Negative)以及產生青黴素酶 (Penicillinase-Producing)之菌株。

肺炎雙球菌(Diplococcus pneumoniae)。

大腸桿菌(Escherichia coli)。

奇異變形桿菌(Proteus mirabilis)。

克雷白氏菌屬(Klebsiella sp.)。

流行性感嗜血桿菌 (Hemophilus influenzae)。

卡他性奈瑟菌(Neisseria catarrhalis)。

【劑量】

成人—每日劑量 1 至 4Gm，分次服用，普通感染，成人劑量為每六小時服用 250mg 對較嚴重的感染，則須較高劑量。

兒童—每日劑量為每公斤體重 25~50mg 分四次服用，嚴重感染時劑量可加倍。

優力黴素 每日劑量

	一般感染	嚴重感染
成人及兒童體重超過 25 公斤者	每六小時 250mg	每六小時 500mg 至 1Gm
兒童體重在 25 公斤以下者	照體重每公斤每日 25~50mg 分四次服用	照體重每公斤每日 50~100mg 分四次服用

本藥須由醫師處方使用。

【副作用】

1. 胃腸道—曾有腹瀉、噁心、嘔吐、消化不良及腹痛的報告，但均不至於達到需要停藥的程度。
2. 過敏性—曾發生紅腫、蕁麻疹及血管性水腫的過敏症狀。但停藥後，症狀可自然消退。其他反應包括生殖器及肛門搔癢，生殖器念珠狀菌病(Genital moniliasis)，陰道炎及陰道異常分泌、眩暈、疲勞、及頭痛，也曾有嗜伊紅性白血球增多症 (Eosinophilia)，嗜中性白血球減少症(Neutropenia)及 SGOT 和 SGPT 輕微增高的報

告。

【注意事項】

1. 對青黴素過敏的患者，使用頭芽孢菌素時應特別小心，因為青黴素族與頭芽孢菌素族間可能具有部份交互過敏的性質(Cross-allergenicity)。
2. 如對優力黴素發生過敏反應，應該停止用藥，並以一般藥物(如腎上腺素或其他加壓胺、抗組織胺、或腎上腺皮質類固醇)治療之。
3. 治療期間，如果發生再感染(Superinfection)時，應該採取適當措施。
4. 腎功能有顯著損傷的患者，其安全劑量可能比一般建議劑量低，所以使用本劑時，應該配合仔細的臨床觀察。
5. 孕婦使用本劑的安全性尚未確定。
6. 使用本劑後，如果採用 Benedict 氏液，Fehling 氏液或 Clinitest 片法檢驗尿糖，可能獲得葡萄糖的假陽性反應。
7. 接受 Cephalosporin 治療期間，可能使直接 Coombs 試驗得到陽性反應，母親在生產前若曾接受 Cephalosporin 的治療而初生嬰兒又有直接 Coombs 試驗的陽性反應，這反應被認為是由 Cephalosporin 所引起的。

【賦形劑】

“優良”優力黴素膠囊(賜福力欣): Aerosil、Primojel、Magnesium Stearate、Lactose、Capsule (Gelatin, Titanium Dioxide, Brilliant Blue FCF, Tartrazine, Sodium Lauryl Sulfate)
“優良”優力黴素膠囊 500 毫克(賜福力欣): Sodium starch glycolate、Talc、Corn starch、Magnesium Stearate、Capsule (Gelatin, Titanium Dioxide, Tartrazine, Sodium Lauryl Sulfate, Brilliant Blue FCF, Sunset Yellow FCF)

【包裝】

“優良”優力黴素膠囊(賜福力欣)/“優良”優力黴素膠囊 500 毫克(賜福力欣)每膠囊含 Cephalexin monohydrate 相當於 250mg 及 500mg 之 Cephalexin base。
“優良”優力黴素膠囊(賜福力欣): 10,50, 100, 500, 1000 顆瓶裝。100 顆鋁箔包盒裝
“優良”優力黴素膠囊 500 毫克(賜福力欣):4-1000 顆鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

委託者: 優良化學製藥股份有限公司
地址: 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號
製造廠: 瑞士藥廠股份有限公司新市廠
地址: 台南市新市區中山路 182 號