

正和



商標

"正和" 悅潰止膜衣錠 20毫克

ULSTOP F.C. Tablets 20mg "C.H."(Famotidine)

悅潰止是屬於 Histamine H₂ 接受體拮抗劑，為 Famotidine 之製劑。

本劑因拮抗胃黏膜壁細胞之 Histamine H₂ 接受體而顯示強力且持續的胃酸分泌抑制作用。又本劑的安全域(LD₅₀/ED₅₀)廣；不具有抗男性荷爾蒙作用及藥物代謝酵素之阻害作用為其特性。

臨床上，一日40mg即對胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血、逆流性食道炎以及Zollinger-Ellison症候群有療效。

⊗成 分：每錠中含有：

Famotidine.....20mg

⊗適 應 症：

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血(消化性潰瘍、急性Stress潰瘍、出血性胃炎而引起)、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群。

⊗用 法 用 量：

1. 通常成人一次20mg，一日二次(早餐後、晚餐後或睡覺前)經口投與。又依年齡、症狀適宜增減之。
2. 上部消化管出血時，通常以注射劑開始治療，待能口服後，始改成經口投與。
3. 本藥須由醫師處方使用。

⊗注意事項：

1. 一般注意事項

治療時應充分觀察其經過，依病狀限用於治療上最小劑量；若本劑未見效果時，請改用其它療法。

2. 下列患者請慎重投與

- (1) 有藥物過敏症之既往歷的患者。
- (2) 有腎不全之患者。
- (3) 有肝障害之患者。

3. 副作用及臨床檢查值之變動

- (1) 過敏症：偶有發疹、皮疹、蕁麻疹(紅斑)。當有這些症狀時，請中止投與。
- (2) 血液：偶有白血球減少。
- (3) 消化器：偶有便秘、下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐等。又極罕有腹部膨滿感、食慾不振等症狀。
- (4) 循環器：鮮有脈搏數增加、血壓上昇、顏面潮紅、耳鳴等。
- (5) 肝臟：偶有S-GOP、S-GPT之上昇等肝機能異常。
- (6) 精神神經系：偶有神經倦怠感、無氣力感。又極罕有頭重感、頭痛等。
- (7) 其他：鮮有月經不順、顏面浮腫等。

4. 孕婦、授乳婦之投與

關於懷孕中投與之安全性尚未確立，孕婦或有可能懷孕的婦人，最好不要投與。又由於會移行至母乳中；因此投與授乳婦時，應注意不要授乳。

5. 對於小兒之投與

對於小兒之安全性未確立。

6. 其他

本劑之投與會隱蔽胃癌引起之症狀；因此，應在確認非惡性後始投與。

衛署藥製字第041352

⊗賦 形 劑：Lactose Monohydrate、Primojel、Methylcellulose、Magnesium Stearate、HPMC、Tween、Castor Oil

⊗包 裝：4-1000錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

⊗儲存條件：請於25°C以下，避光處儲存。

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路23號(新營工業區)