


脈索林錠 2.5 毫克 Vasorine Tablet 2.5mg

【成分】每顆含有 Midodrine Hydrochloride 2.5mg



【賦形劑】Povidone K30, Microcrystal Cellulose 102, Croscarmellose Sodium, Aerosil 200, Magnesium Stearate。

【適應症】體質性血壓過低，直立性循環系統失調，病後、手術後及產後之血壓過低。

【用法用量】除非有其他特別處方，請嚴格照著建議劑量使用。

循環失調：成年及青年(12 歲以上)：每次一錠，一天 2 錠(早、晚各一錠)。

特殊病例可能須改為每次一錠，一天 3 次。

某些個例可每次 1/2 錠，一天 2 次。

正在服用鎮定劑或催眠劑的病人，使用本品之起始劑量應為一次 1 錠，一天 2 次，若需要，劑量可增至一次 2 錠，一天 2-3 錠。

兒童：由醫師按體重決定使用劑量。

尿失禁：成人：一次 1-2 錠，一天 2-3 錠。

【禁忌與注意事項】

下列病人不可投與本品：高血壓，腎上腺髓質瘤(嗜鉻性細胞瘤)，急性腎炎，嚴重腎功能不足，青光眼，已形成尿殘留之攝護腺肥大，排尿機械性阻塞，甲狀腺機能亢進症。

【副作用】

可能會在某些個別病例中發生心律不整，心臟痛和皮膚上的反應(紅疹)。

【藥物交互作用】

本品之作用可被 α -阻斷劑如 Prazosine、Phentolamine 或 Reserpine 降低或中和。與強心配醣體(毛地黃製劑)共同使用會加強本品使心率減少之作用，在某些病例中會導致心率不整。與 Atropine 或 Cortisone 製劑共用會加強本品之升壓效果。

【耐藥性】

無已知之耐藥性。

【特別警告】

長期使用本品治療，需檢查腎功能。與其他對血壓或心跳速率有作用的藥物合用需有醫師明確指示，且需經常監控血壓和心跳速率。

若有上述禁忌等存在發生副作用，請告知醫師。正懷孕或治療期間打算懷孕之婦女也請告知醫師。放置在兒童拿不到的地方。

【特性及效能】本品藉著增加已鬆弛血管的張力和預防血液大量滯留於下肢靜脈來升高血壓。此種血液滯留常導致腦血流供給不足而產生頭昏眼花及循環虛脫。

【儲存】不可放置在溫度高於 25°C 處。需避光儲存。

將藥物連外盒一起儲存。有任何疑問請向你的醫師或醫療院所諮詢。

【包裝】4-1000 錠 PVC/PVDC-ALU 鋁箔盒裝、HDPE 塑膠瓶裝。

藥商/製造廠：健亞生物科技股份有限公司

廠址：303 新竹縣湖口鄉中興村 19 鄰工業一路 1 號