



消化性潰瘍治療劑

**胃治潰<sup>®</sup>** 膜衣錠

(鹽酸雷尼得定) 150毫克

**Vesyca<sup>®</sup>** Film Coated Tablets  
(Ranitidine Hydrochloride) 150mg

所謂消化性潰瘍即指在胃液可達到的消化道管壁粘膜所產生的急性或慢性潰爛，據保守估計，總人口10%左右的人曾罹患此病。關於消化性潰瘍的成因有許多種學說曾被提出，但眾說紛紜，莫衷一是，荷爾蒙、胃液酸度、胃出空時間、情緒、遺傳、血型、種族.....等都是可能的因素，因此遂有制酸劑、自律神經遮斷劑、肉芽增生劑、潰瘍面保護劑及各種精神安定劑等種種藥物療法。時至今日已獲致一點公認的定論—沒有胃酸、胃蛋白之存在即無潰瘍之產生，因之，制酸劑、副交感神經遮斷劑等便成為當今消化性潰瘍治療之主流；但其腹瀉、便秘、骨質疏鬆、口乾、視力模糊、影響其他藥物之吸收等不利點依然存在而未能臻於盡善盡美之境地，然而，Histamine H<sub>2</sub>-receptor antagonist-----Ranitidine的問世則為消化性潰瘍療法開創了新的境界。

自從1972年J.W.Black氏發現H<sub>2</sub>-receptor antagonist以來，抗組織胺劑之作用機轉便得以充分了解，抗組織胺劑也被分為H<sub>1</sub>-blocker與H<sub>2</sub>-blocker兩大類，H<sub>1</sub>-receptor主要位於腸與支氣管平滑肌，可被傳統的抗組織胺劑所阻斷，H<sub>2</sub>-receptor位於胃壁。心房與子宮，只有Cimetidine、Burimamide、Metiamide及Ranitidine等H<sub>2</sub>-blocker方能起作用，其可抑制胃酸的分泌，減少胃蛋白的產生，故廣被使用於消化性潰瘍之治療而顯示相當突出的治療功效。

### 【成 分】每錠中含：

Ranitidine (as Hydrochloride).....150mg

### 【作 用】

1. 本藥為一可逆性之Histamine H<sub>2</sub>接受器阻斷劑，其可選擇性作用於胃壁細胞上之組織胺接受器而有效抑制胃酸的分泌，且無一般抗膽鹼劑之不良反應。
2. 本藥對於基礎胃酸分泌(basal gastric acid secretion)及由betazole、pentagastrin、食物、組織胺等刺激物所引起之刺激性胃酸分(stimulated gastric secretion)均可確實抑制之。對於白天及夜晚的疼痛也可同時降低。
3. 本藥並不影響胃蛋白?的分泌量，但因胃液分泌量的減少，活性的胃蛋

- 白?總數亦成比例的降低。
4. 本藥不像Cimetidine會受一些藥物干擾，如lidocaine、warfarin、theophylline和phenytoin.....等，而這些藥物在臨床上與本藥併用並無禁忌症。
  5. 本藥對於空腹或飽飯後之血中胃泌素濃度幾乎無影響。同時對肝酵素P-450、血中之gonadotropins、TSH、GH均無影響，而且不改變Cortisol、aldosterone、androgen或estrogen之血中濃度。此外，對精子的數目、運動性或形態學亦無影響。

## 【適應症】

十二指腸潰瘍、良性胃潰瘍、邊緣性之消化性潰瘍、回流食道炎及高濃度胃酸分泌症候群。

## 【用法用量】

通常成人每次1錠，一天服用2次。對於高濃度胃酸分泌症候群(Zollinger-Ellison Syndrome)嚴重者可一天數次服用，其最高日劑量可達6g。  
本藥須由醫師處方使用。

## 【禁忌症】

曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。

## 【注意事項】

1. 對於腎功能障礙者宜降低劑量。
2. 使用本藥可能會出現可逆性的停經症狀。
3. 孕婦及授乳婦宜衡量利弊再投與。
4. 副作用：偶而有頭痛、皮疹、下痢、眩暈、不眠、可逆性精神混亂、精神激昂、抑鬱、幻想等現象，特別是年紀大的患者。心動過速、心動徐緩、心室提前收縮、白血球減少、顆粒白血球減少、血小板減少症及全部血球減少、過敏反應(如支氣痙攣、發燒、皮疹、嗜伊紅血球過多症)亦可能發生。

## 【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

## 【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始

投與。

### 【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

### 【副作用】

偶而有頭痛、皮疹、下痢、眩暈、不眠、可逆性精神混亂、精神激昂、抑鬱、幻想等現象，特別是年紀大的患者。心動過速、心動徐緩、心室提前收縮、白血球減少、顆粒白血球減少、血小板減少症及全部血球減少、過敏反應(如支氣管痙攣、發燒、皮疹、嗜伊紅血球過多症)亦可能發生。

### 【保存上之注意】

- 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 室溫(15-30°C)、避光儲存。
- 請在有效期限內使用。

### 【包裝】

4~1000錠瓶裝、盒裝。

永信藥品工業股份有限公司  
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD TAIWAN R. O. C.  
公司住址:台中縣大甲鎮中山路1段1191號  
電話: (04) 26875100  
台中幼獅廠:台中縣大甲鎮日南里工九路27號