

“羅得”胃佳液
Weigen Liquid"Root"

衛署藥製字第 032935 號

GMP G-1971

本劑中所含之 Dried Aluminum Hydroxide Gel 服用後在胃內與過剩之胃酸中和而產生氯化鋁，另 Magnesium Hydroxide 成份亦有制酸作用，且使胃酸保持在 pH3 之正常狀態。每 15ml 之酸中和能力為 21.87mEq。

【作用】

本藥因含有鋁及鎂之制酸成分，故可中和胃酸，每次服用 15ml 之劑量其酸中和能力為 21.87mEq 以上，本品每次服用劑量所含鎂(Mg)之 mEq 為 12.86mEq。

【成分】

有效成分及含量：

每毫升中含有(Each ml Contains):

Dried Aluminum Hydroxide Gel. 36mg

Magnesium Hydroxide 32mg

其他成分(賦形劑):

Sorbitol Solution 70%、Methylparaben、Propylparaben、L-Menthol、Carboxymethylcellulose、Ethanol、Sodium Saccharin、Orange Essence、Water Purified.

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 一、 有下列情形者，請勿使用：
(一) 曾因本藥成分引起過敏者
- 二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一) 3 歲以下。
(二) 消化道潰瘍的人。
(三) 有腎臟疾病的人。
(四) 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二) 與其他藥品併用時。

【其他使用上注意事項】

- 一、 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 二、 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 三、 避免陽光直射。
- 四、 勿超過建議使用量。
- 五、 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
- 六、 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	一天 3 次，或需要時服用，成人每次 15ml(1 包)。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

- 一、 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

- 二、 服用本藥後，若有以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一) 若有任何不適情況發生。
(二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存方法】請貯存於 25℃ 以下且避光保存。

【包裝】90~4000ml 塑膠瓶裝、6~266 包鋁箔袋盒裝(每包 15ml)

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段 65 號