

【仿單】

W 95 mm × H 200 mm

“福元”**胃乳錠** 300 毫克 (乾燥膠體氫氧化鋁)

Weil Tablets 300 mg “F.Y.” (Aluminum Hydroxide Dried Gel)

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 042942 號

【成分】每錠中含有：

Aluminum Hydroxide Dried Gel 300 mg

賦形劑：

Potato Starch、Magnesium Stearate、Talc、Menthol、
Sodium Starch Glycolate、Sucrose、Microcrystalline
Cellulose 101

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

單次劑量(2 錠)之酸中和能力為 10.0 mEq。

【用法用量】

一天 3 ~ 4 次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次 2 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/2 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食，請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

【警語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5g。
 - (2) 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
 - (3) 一天內不可服用超過一日最大劑量(3g)，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (4) 不得併用其他藥品。
2. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
3. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
4. 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

【儲藏條件】請貯存於 25℃ 以下之陰涼處，且於期限內使用。

【包裝】12 ~ 1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝、Alu-Foil 鋁箔盒裝。

LT-T003

福元化學製藥股份有限公司

新北市瑞芳區大寮路 95-1 號