



十全藥品

衛署藥製字第048697號
G-9578號

“十全”力癲錠

Zepanc Tablets

【成分】 Each tablet contains:

Clonazepam 2 mg

【作用】

在動物試驗中顯示Clonazepam具有benzodiazepine類如鎮靜、抗痙攣及肌肉鬆弛等的作用，其中以抗痙攣作用最強，Clonazepam具有抗癲癇特性。如同其他的抗癲癇藥物，Clonazepam抗痙攣作用的機轉目前並不十分明確，但從動物及人類腦波試驗中發現，Clonazepam對大腦皮層及次皮層之癲癇病灶有顯著的抑制作用，能壓抑小發作不正常腦電波的釋放，減少輕度運動發作的頻率及強度。

【適應症】

癲癇。

【用法用量】

劑量需依不同年齡及患者臨床的反應及耐受性給予適當劑量調整。一般用量需由最低劑量逐漸增加調整至最佳療效的維持劑量，每日維持劑量範圍如下。(可視需要性而增加)：

嬰兒0.5-1 mg、幼童1.5-3 mg、孩童3-6 mg、成人4-8 mg上述劑量每日分3至4次口服，治療2-4週後調整至最佳療效的維持劑量。本藥須由醫師處方使用。

【副作用】

1. 長期服用Clonazepam對血液、腎臟、肝臟及腸胃等器官，並無毒性或不良副作用之報告。
2. Clonazepam有鎮靜及肌肉鬆弛之作用，故一般的副作用包括疲勞、嗜睡、肌肉無力或行為能力失調等，而這些現象多發生於治療初期或劑量增加時，大多數為短暫性或當繼續治療時會自然消失。
3. Clonazepam可能會導致嬰兒及幼童的唾液及支氣管分泌增加的情況產生，故須注意維持其呼

吸管道的通暢。

4. Clonazepam對治療癲癇患者行為失調有效，但在有些特例患者可能會產生攻擊性、易怒、精神激動等情況。
5. 在使用Clonazepam之治療期間可能會產生依賴性，尤以下列患者較明顯如高劑量長期使用，患者先前有酒精中毒、藥物濫用、嚴重精神或人格異常等情形。
6. 為了減低依賴性的產生，投與Clonazepam時必須審慎確認症狀並避免長期投與，如需長期投與時必須評估其治療利益及風險並做定期之治療監測。
7. 依賴性禁斷症狀的產生因人而異，可能從幾個小時到一週或更久，常見之症狀輕微者有戰慄、不安、失眠、焦慮、頭痛或精神不集中，有時盜汗，肌肉或下腹的痙攣，認知的異常等亦可能發生，精神錯亂或痙攣則較罕見。

【注意事項】

1. 在治療期間必需囑咐病人絕對避免飲用含酒精飲料，因酒精會激發癲癇之發作，降低Clonazepam之療效或引起無法預知之副作用。
2. Benzodiazepine類藥物，因劑量改變或個人的敏感性，Clonazepam可能會改變病人的反應，諸如駕駛或操作機械之行為能力等。
3. Clonazepam與其他抗癲癇藥同時併用時，必須要調整個別藥物的劑量，以期能達到所需的治療效果。
4. 服用Clonazepam治療時，患者不可貿然停藥，必須逐漸將藥量減少以避免禁斷症狀產生，如有禁斷症狀產生時，對患者施行適當的控制及治療支持。

【包裝】：

4~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】：

25°C以下儲存

十全實業股份有限公司

南投市南崗工業區仁和路27號

電話：(049) 2254221-3

經銷商：睿昶興業有限公司

竹南鎮民族路103號