

《不良反應》

1. 有一般類固醇引起之局部不良反應報告：燒灼感、癢感、刺激感、乾燥感、毛囊炎、多毛症、口腔皮膚炎、過敏性接觸性皮膚炎、皮膚浸潤、二次感染、皮膚肥大、條紋、疹子。
2. 臨床上有低色素反應之報告。

《注意事項》

1. 本劑只供外用，避免塗抹於眼部及患部以外的區域。
2. 治療處不要使用繃帶或其他覆蓋物。
3. 大面積的治療或長期使用時，會經皮膚吸入而系統性吸收產生HPA(Hypothalamic-pituitary-adrenal)抑制反應。
4. 動物試驗有畸形胎報告，孕婦避免使用。
5. 本藥會由乳汁分泌，授乳婦慎用。
6. 10歲以下小孩安全性未確立，應慎用。
7. 如發現皮膚有新病變，須立即請教醫師。

《儲存》

儲存於25°C以下。

《包裝》

1000gm 以下軟管裝及罐裝。

本品代號：chemin

委託者：

華興化學製藥廠股份有限公司
彰化縣田尾鄉饒平村四維巷128號

製造廠：

瑞士藥廠股份有限公司新市廠
台南市新市區中山路182號



華興製藥

抗炎止癢軟膏

“華興” 去敏軟膏 0.25%

(去氫氧迪皮質醇)

Chemin Ointment 0.25% "H.S."
(desoximetasone)

衛署藥製字第 032938 號(G-1974)

《簡介》

去敏是種外用腎上腺皮質素，可治療各種皮膚感染症，尤其對發炎及瘙癢有顯著的療效。

《成份》

去敏軟膏每公克含：

Desoximetasone.....2.5mg

《賦形劑》

Liquid Paraffin、White Soft Paraffin、Glyceryl Monostearate、Stearyl Alcohol、Span 60、Aluminum Stearate、Wax、Butylated Hydroxyanisole、Propylene Glycol、Carbomer、Tween 60、Citric Acid、Triethanolamine、Bouquet、Water Purified

《適應症》

濕疹、牛皮癬、燒傷、曬傷、昆蟲咬傷等皮膚感染症。

《用法用量》

每日二次塗敷於患部，本藥須由醫師處方使用。