



“南光” **沙林** 注射液 0.9 %
Saline Injection 0.9 % "N.K."

□ 成 分：Each mL contains:

Sodium Chloride..... 9 mg

□ 賦形劑：Water for Injection。

□ 適應症：水分及電解質之補充。

□ 用法用量：本藥限由醫師使用。

通常成人一次500~1000 mL，劑量由醫師視病人之需要而定，藉皮下、肌肉或靜脈注射。

適量當做注射用醫藥品的溶解、稀釋用溶媒。

□ 注意事項：

一、取用時:

1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

2.若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

二、輸液套選用及插入法:

1.請依輸液套使用方法正確使用。

2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□ 儲 藏：塑膠瓶裝及塑膠軟袋裝於30℃以下儲存。

安瓿、小瓶、預充填針筒及玻璃瓶裝於25℃以下儲存。

□ 包 裝：2、5、10、20毫升安瓿或小瓶裝，100支以下盒裝。

100、250、500、1000、2000毫升玻璃瓶裝，

100、250、500、1000毫升塑膠軟袋裝，

250、500、1000毫升塑膠瓶裝，100支以下盒裝。

2.5、3、5、10、20毫升預充式注射針筒裝，100支以下盒裝。

衛署藥製字第 029836 號

*250、500毫升塑膠瓶裝委託永豐化學工業股份有限公司新莊工廠製造



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號、1001-1號

TEL: (06)5984121(代表) FAX: (06)5981845