

13X25Cm

複合抗生素

衛署藥製字第25079號

“中菱”康保西林膠囊  
COMBICILLIN Capsules “C.R.”

人體細菌感染往往是混合感染，故本品針對於此，為複合抗生素，對革蘭式陽性及革蘭式陰性細菌均有著效，尤其Dicloxacillin可殺滅產生Penicillinase之葡萄球菌，使Ampicillin不受Penicillinase水解而破壞，可增強G（-）細菌之殺菌力，本品對於混合感染，複雜感染或病原菌種難以確定者有顯著的治療效果。

【成份】：每粒中含有

Ampicillin trihydrate 288mg

相當于Ampicillin.....250mg（力價）

Dicloxacillin sodium monohydrate 136mg

相當于Dicloxacillin.....125mg（力價）

【賦形劑】：

Starch corn dried、Magnesium stearate、Gelatin、Sodium lauryl sulfate、Titanium dioxide、New coccin、Tartrazine、Brilliant blue FCF、Purified water、White Ink.

【作用特點】：

- 1.對G（+）及G（-）均有抗菌作用。
- 2.混合感染而無法確定其菌種者適之。
- 3.口服迅速吸收，可在血中達高濃度，而且毒性低。

【適應症】：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【用法用量】：

一般成人每次1~2粒，每天四次服用。本藥須經醫師處方使用。

【注意事項】：

- 1.一般事項：
  - (1)對其他青黴素、青黴素衍化物或頭孢菌素產生變異反應者，對本劑亦有可能生變異反應。
  - (2)曾有一般生變異反應（氣喘、濕疹、枯草熱、蕁麻疹）病歷者，嚴重腎功能不全者，小心使用。
  - (3)使用本劑生變異反應，請即時停止使用。
- 2.授乳時：

Ampicillin, Dicloxacillin均會進入乳汁中，雖不曾發生重大問題，但須顧慮由母親授乳時嬰兒可能會起敏感作用。
- 3.孕婦：

對人員雖無損害的正式報告，但仍有冒險的顧忌。
- 4.藥物交互作用：
  - (1)Allopurinol  
同時Allopurinol共用，特別對高尿酸血症患者引起皮膚潮紅的機會增加。
  - (2)Probenecid  
共用時會減慢Ampicillin, Dicloxacillin在腎小管中之排泄，造成血中濃度提高和保持，也增加毒性。
  - (3)Tetracycline  
用於治療腦膜炎或其他要快速殺菌效果之場合，因制菌劑會妨礙本劑的殺菌效果，最好避免同時服用。
- 5.診斷妨礙：
  - (1)會提高SGOT值。
  - (2)Ampicillin會妨礙尿中葡萄糖試驗（在Ampicillin高尿中濃度時，在硫酸銅試驗時可能造成假陽性反應，葡萄糖酵素試驗則不受影響）。
  - (3)Dicloxacillin會妨礙Cephalin凝絮試驗。

【包裝】：

1000粒瓶裝。

委託者： 中菱醫藥有限公司  
台北市內湖區瑞光路258巷56號5樓之2

製造廠： 中國化學製藥股份有限公司  
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
台中工廠：台中市工業區15路10號®