

"信東" 利速復 膠囊 500公絲 (西華定) Lisacef Capsules 500mg (Cephradine) 【作 用】 Cephradine為新合成頭孢子菌素系（Cephalosporin）廣效性抗生素之一種。對大部分革蘭氏陽性及陰性細菌具有殺菌作用。且能有效作用於會產生青黴素酶（Penicillinase）之菌種。由於吸收良好且迅速，故Cephradine特別適合於口服治療，也可用於注射醫療。藥物以高濃度由腎臟排泄至尿中，因在體內未改變藥物作用型態，故本品可應用於尿道感染治療。 【成 分】 主成分：Each capsule contains： Cephradine (as monohydrate)500mg (Potency) 賦形劑：Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate、Capsule Shell (含Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、New Coccin、Tartrazine)。 【適應症】 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。 1	【說 明】 Cephradine主要用於治療生殖泌尿道、胃腸、吸呼吸道、皮膚及軟組織等病因性細菌感染之疾病。感染之細菌包括如下： 1. 葡萄球菌感染－包括能產生青黴素酶菌種，如膿腫、癰、支氣管炎、膿皰病。 2. 鏈球菌感染－蜂窩組織炎、肺炎、濾泡性扁桃腺炎、中耳炎、咽炎、齶炎、猩紅熱、腐敗性潰瘍、喉頭及尿道感染。 3. 肺炎球菌感染－大葉性肺炎、支氣管炎、蜂窩組織炎及中耳炎。 4. 流行性嗜血菌感染－中耳炎、咽氣管支氣管炎。 5. 大腸桿菌感染－膿腫和尿道感染。 6. 克雷白氏菌屬感染－大葉性肺炎、尿道感染。 7. 志賀氏菌屬感染－細菌性赤痢。 8. 沙門氏菌屬感染－腸炎。 應先做細菌學之研討，依此來決定病因性細菌對Cephradine感受程度及測驗治療效果。 【用法・用量】 成人： 生殖泌尿道感染一般用量為每日四次，一次500mg，對複雜病情如前列腺炎、副睪炎須長期高濃度之治療。 呼吸道感染一般用量為每日四次，一次250mg。 胃腸道感染一般用量為每日三～四次，每次500mg。 2	小孩： 一般用量每日以體重每公斤25～50mg用量，分四次服用之。 病情嚴重或慢性感染疾病：口服最大量可用至每次1g，一日四次。 對所有的病人，不管年齡及體重，治療上最少應該維持48至72小時，以至無症狀及細菌感染現象。如果是被嗜血性系鏈球菌感染，治療須10天，以保護發生關節炎或血管球形腎炎危險。對慢性尿道感染，在治療期中須常作細菌學和臨床檢驗，可繼續數月之治療。對頑固感染須治療數週。因本品是Cephalosporin系中唯一口服和注射兩用之抗生素。在注射治療要改為口服治療上很方便，在用量上可維持一樣，不須考慮因不同藥物所產生不同效果。 本藥須由醫師處方使用。 【副作用】 一般副作用有微弱胃腸不適症狀。偶爾有皮膚反應，很少嚴重到須停止用藥治療程度，無牙齒色素沈著現象，對光過敏或血液性惡病質。偶爾也有過敏性現象與其他Cephalosporin大致相同，因各別之過敏性背景如氣喘、乾草熱、蕁麻疹或以前曾用過而有過敏性現象者。 【注意事項】 1. Penicillins與Cephalosporins有部分性交叉過敏現象，因此Cephradine對曾有Penicillin過敏性現象患者應小心使用。 3
---	---	--

2. 因Cephradine在血液和組織中有積蓄作用，故除非用量適當地減少，對腎功能不全者應注意臨床情況和腎功能檢查。 3. 當與別種抗生素長期使用，可能會引起無作用性細菌之生長，用Cephradine治療時，尿中如用Benedicts或Fehling溶液或用Clinitest片測驗，可能會發生假葡萄糖正反應。但用酵素基測定如Clinistix則無此反應。相同的，以Cephalosporins類治療，會發生假性Coombs測驗正反應。 【妊婦之使用】 雖然動物研究中曾證明無妨害胎兒作用，但除非必須使用，否則在懷孕中，尤其是初期三個月內避免使用此藥。 【禁 忌】 本品禁用於已知患者對Cephalosporins有過敏性之患者。 【細菌學】 以下之細菌在體外試管試驗均有感受性作用。 (A) 革蘭氏陽性細菌 Penicillin — sensitive、Penicillin — resistant、Staphylococci、Streptococcus pyogenes、Group D Streptococcus spp. (enterococci)、Streptococcus pneumoniae。 4	(B) 革蘭氏陰性細菌 <i>E. coli</i>、<i>Klebsiella</i> spp.、<i>Proteus mirabilis</i>、<i>Proteus vulgaris</i>、<i>Haemophilus influenzae</i>、<i>Salmonella</i> spp.、<i>Shigella</i> spp.、<i>Neisseria</i> spp.。 (C) <i>Pseudomonas</i> spp. 有抵抗性 【包 裝】 8～1,000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝、玻璃瓶裝。 【貯存和安定性】 裝於避光之緊密容器內，置於冷暗乾燥處。 衛署藥製字第037125號 G-3955  信東生技股份有限公司 觀音廠 桃園市觀音區國建一路1號 5	"信東" 利速復 膠囊 500公絲 (西華定) Lisacef Capsules 500mg (Cephradine) 成分： Each capsule contains： Cephradine (as monohydrate) ...500mg (Potency) 適應症： 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。 注意事項： 請詳閱說明書。 用法・用量： 請詳閱說明書。 本藥須由醫師處方使用。 衛署藥製字第037125號 G-3955  信東生技股份有限公司 觀音廠 桃園市觀音區國建一路1號 54120279 ㊄ 內有說明書請由此打開
--	--	---

"信東" 利速復 膠囊 500公絲 (西華定)

Lisacef Capsules 500mg (Cephradine)



信東生技股份有限公司 觀音廠
桃園市觀音區國建一路1號