

G.M.P. 藥品

止痛劑

衛署藥製字第041557號
G-5957

“派頓”

頓痛特 膠囊50毫克 (鹽酸妥美度)

Tramtor

Capsules 50mg

“Patron”(Tramadol Hydrochloride)

[成分]: 每膠囊含有 :Tramadol Hydrochloride.....50mg

[賦形劑]: Lactose, Magnesium Stearate.

膠囊 :Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate , Purified Water, Tartrazine, Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide.

[適應症]: 中度至嚴重的急、慢性疼痛。

[用法用量]: 本藥須由醫師處方使用。強烈疼痛時應調整劑量，一般依照下列劑量服用：

單劑量：成人與14歲以上的青年男女：一次一膠囊，與一些流質一起服用。

此劑量通常已足夠減輕疼痛，假如還不能止痛，30~60分鐘後再服用一粒膠囊。

一天之劑量：不超過400毫克的Tramadol Hydrochloride(相當於8粒Tramtor膠囊)。

[禁忌症]: 與酒精、安眠藥、止痛劑或精神製劑合併使用會造成急性中毒。懷孕與授乳期應考慮危險性方可服藥。對含鴉片的安眠藥或麻醉藥敏感的病人應小心使用。

[副作用]: 服Tramtor之後會有發汗、眩暈、嘔吐、口乾或疲勞的副作用。極少數病例對心血管系統會有影響，尤其是病人緊張時更易引起副作用。

[相互作用]: 與中樞神經系統的藥物〔例如鎮定劑、安眠藥〕併用，可能會加強其鎮定作用。當病人正用單胺氧化酶(MAO)抑制治療時，禁止服用Tramtor。

[治療時間]: 某些病例長期使用，可能會產生依賴性。所以醫師應決定時間長短和是否暫時停藥。Tramtor不能長期給藥而超過治療之所須。腎和肝功能受損者，應調整劑量。

[注意]: 縱使依據醫師處方服藥，亦會影響病人的反應力，如駕駛汽車與操作機器者，尤其是與酒精一起服用時。

[給病人之知識]: Tramtor是一種強效的止痛劑，一般用於傷痛、骨折嚴重神經痛、腫瘤痛、心臟病發作。應不被用於輕微的疼痛。本品作用迅速，藥效持續數小時。

[包裝]: 6~1000粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。



臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨東路50號

電話：(07)6216126

