

國軍左營總醫院藥劑科民眾用藥指導單

商品名	學 名	中文商品名	含量	QR CODE
Euricon	Benzbromarone	優力康錠	100mg/tab	
			50mg/cap	

■ 藥品效用

預防痛風發作，促進尿酸排除。

■ 服用指示

服藥時，請勿與含酒精的飲料併服。因為酒精性飲料會增加尿酸形成，也會降低本藥的效果。

■ 忘記吃藥怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥期間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

■ 注意事項

1. 服藥期間，勿攝取過量富含維生素 C 的食物或藥品，且成人每天至少喝八杯(二公升)開水。
2. 服用本藥期間，宜視情況每半年定期回診做肝功能檢查。

■ 副作用

每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：異常疲倦或虛弱，眼睛或皮膚變黃，食慾不振。這些症狀會隨時間慢慢減弱。上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：腹瀉、噁心、皮膚紅疹或蕁麻疹。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
諮詢專線：07-5817121 轉 2002 或 5887104