

國軍左營總醫院藥劑科民眾用藥指導單

商品名	學 名	中文商品名	含量	QR CODE
Desora	Desloratadine	治敏樂膜衣錠	5mg/tab	

■ 藥品效用

緩解乾草熱、感冒及季節性過敏症狀包括蕁麻疹、流鼻水、打噴嚏、呼吸道刺激、皮膚癢、眼睛癢、流眼淚等。第二代抗組織胺藥物較少嗜睡的副作用。

■ 服用指示

1. Desloratadine 一般一天服用一次，於飯前一小時或飯後二小時空腹服用，除非您會覺得胃部不適。驅特異錠則建議於晚餐時服用。
2. 遵照醫師處方服用應服劑量，切勿擅自增加。

■ 注意事項

1. 若您曾對抗組織胺藥物有過敏反應、肝功能不佳者、可能或已懷孕、授乳等，使用此藥前，應先告知醫師。
2. 除非醫師建議，否則不得併用 Ketoconazole，Itraconazole(抗黴菌藥物)，Cimetidine(潰瘍用藥)、Erythromycin(抗生素)等，以免造成心律不整。
3. 若有其他疾病，如青光眼、前列腺肥大、甲狀腺機能亢進、尿道阻塞等，應先告知醫師。
4. 由於此藥可能會使您想睡，在熟知其作用前，避免開車及操作機械。
5. 使用 Desloratadine 應多喝水、避免曬太陽及喝酒。
6. Desloratadine 會影響血糖與懷孕測試。
7. Desloratadine 會使尿液變色，這是無害的。

■ 此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了怎麼辦？

症狀可能有疲倦、食慾增加、頭暈、煩躁不安、口乾、排尿困難、便秘。以上症狀會隨著時間慢慢減緩；若一段時間後症狀仍持續或嚴重，請與醫師聯絡。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
諮詢專線：07-5817121 轉 2002 或 5887104