

國軍左營總醫院藥劑科民眾用藥指導單

商品名	學 名	中文商品名	含量	QR CODE
LIXIANA	Edoxaban	里先安膜衣錠	60mg/tab	
藥品外觀：黃色圓形 DSC/L60				

■ **作用：**1. 預防非瓣膜性心房纖維顫動合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞。危險因子包括：鬱血性心臟衰竭、高血壓、年齡≥75 歲、糖尿病、曾發生中風或暫時性腦缺血。2. 在初始 5 到 10 日的非經腸道抗凝血藥物治療後，Lixiana®可用於治療靜脈栓塞。靜脈栓塞包括深層靜脈栓塞及肺栓塞。

■ **使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：**

1. 曾經對此藥有過敏反應者。
2. 若您有出血問題。
3. 打算懷孕、已懷孕或哺乳者。
4. 肝腎功能不全患者

■ **正確服藥方法：**

1. **盡量於每日同一時間投與；如果醫師有其他指示，依照醫師指示使用。**
2. 請配合醫師的指示服藥，勿自行改變劑量或停藥。
3. **忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間(超過間隔一半)，就不必補服，切記不可補服二倍劑量。**
4. 請連同藥袋儲存於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

■ **注意事項：**

1. 服藥期間如果需要進行**大小手術(例如：拔牙)、裝置導尿管、直腸鏡等，請告知醫師。您可能會需要暫時停用藥物，請配合醫師指示的時間停藥或恢復服藥。**

2. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。

3. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。

■ **可能發生之副作用：**出血問題、噁心、關節痛、背痛。

■ **若您有下列任一症狀，請立即就醫：**

1. 懷疑藥物服用過量中毒。貧血、肝功能指數異常等。
2. 過敏反應的症狀如血管性水腫與過敏性水腫。
3. 任何出血問題的症狀，像是挫傷、需長時間才能止血的割傷等，請立即就醫。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
藥物諮詢專線：07-5817121 轉 2008 或 5887104