



治療氣喘最新首選用藥 迅速幫助患者達的最佳氣喘控制

第一步驟




首先移除吸入器的保護蓋，然後確認吸入口是乾淨的，沒有灰塵或其它外來物。若有需要，可在吸入口接上延長管使用。

第二步驟




將吸入器直立置於拇指與食指之間，拇指放在底部，亦即吸口的下方，然後避開藥物的吸口，盡量的吐氣。

第三步驟



將吸入口置於齒間，緊閉嘴唇，但不要咬它。

第四步驟



開始用口吸氣時，接著立即用食指在吸入器的上方往下壓釋出藥品，同時仍保持持續緩慢且深吸氣的動作。吸氣後移開吸入口，閉氣10秒或直到你覺得需要換氣為止。

依照醫師所處方的劑量使用，使用Foster後，請漱口。



肺舒坦


FOSTER®

Beclomethasone+Formoterol


**GINA 氣喘治療指引推薦
治療氣喘新首選複方用藥**

什麼是氣喘？

氣喘的發炎反應，是造成氣喘的主要原因。氣喘是一種支氣管慢性發炎的反應，發炎是同時影響大小支氣管，而發炎的結果會造成支氣管水腫、黏液增加等，使得支氣管內管徑減少，進一步引起的支氣管收縮及過度反應，造成病人會呼吸不順、喘、咻咻聲等症狀。



發炎的氣管



健康的氣管



治療用藥

目前的用藥治療主要是採用皮質類固醇與支氣管擴張劑的合併性複方吸入劑，如：**FOSTER 肺舒坦**。現已有相關研究證實：**FOSTER 肺舒坦**藉由超微粒藥物分子，可同時治療大小支氣管的發炎反應及擴張支氣管。



友華生技醫藥股份有限公司
Orient EuroPharma Co., Ltd.

衛署藥輸字第 025092 號