

國軍左營總醫院藥劑科民眾用藥指導單

商品名	學 名	中文商品名	含量	QR CODE
XARELTO	Rivaroxaban	拜瑞妥膜衣錠	15mg/tab	

■ **作用：**此藥用於預防血液凝塊。

■ **使用本藥之前，有下列狀況應告知醫師：**

1. 曾經對此藥有過敏反應者。
2. 若您有出血問題。
3. 打算懷孕、已懷孕或哺乳者。

■ **正確服藥及儲存方法：**

1. 飯前或飯後服用均可。若引起肚子不舒服，則與食物一起服用。
2. 請配合醫師的指示服藥，勿自行改變劑量或停藥。
3. 忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可補服兩倍劑量。
4. 請連同藥袋儲存於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。

■ **注意事項：**

1. 服藥期間如果需要進行大小手術(例如：拔牙)、裝置導尿管、直腸鏡等，請告知醫師。您可能會需要暫時停用藥物，請配合醫師指示的時間停藥或恢復服藥。
2. 您可能會更容易出血，請盡量避免容易流血的行為，例如可用軟毛牙刷取代硬毛牙刷，或者手動式刮鬍刀可改為電動式。避免刮傷、防止受傷，並避免跌倒或發生碰撞意外。
3. 跌倒或發生意外，特別是若您撞到頭部，
4. 若您時常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告知您的醫師。
5. 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。
6. 具有生育能力婦女應採與有效避孕措施才能使用本品。
7. 若您正以母乳餵哺幼兒，請告知醫師。您將必須討論對嬰兒造成的風險。

■ **可能發生之副作用：**出血問題、噁心、關節痛、背痛。

■ **若您有下列任一症狀，請立即就醫：**

1. 懷疑藥物服用過量中毒。
2. 過敏反應的症狀如出疹、蕁麻疹、皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒、喘鳴、胸口或喉嚨緊繃、難以呼吸或說話、嗓音異常嘶啞或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
3. 嚴重頭痛、嚴重眩暈或失去知覺。
4. 手或腳麻木或有刺痛感。
5. 思緒或思考邏輯方面有明顯的改變。
6. 異常瘀傷或出血、尿中帶血、血便、嘔血。
7. 皮膚傷口不癒。

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向
醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務
藥物諮詢專線：07-5817121 轉 2002 或 5887104