

國軍左營總醫院藥劑科民眾用藥指導單

商品名	學 名	中文商品名	含量	QR CODE
You-jet	Sertraline	憂解膜衣錠	50 mg/tab	

■ 藥品效用

1. 治療憂鬱症。
2. 治療強迫觀念及強迫行為、自殘行為。

■ 服用指示：

1. 通常早上一日服用一次或是早上中午各服用一次。
2. 請遵照醫師指示服用，勿自行調整劑量或停藥。雖然服用 Sertraline 的前三週症狀便有改善，一般須服用四週才能完全發揮藥效。其他選擇性血清素再吸收抑制劑也須 7 至 10 天才能達到最大的效果。

■ 注意事項：

1. 這些藥品可能會讓您覺得頭暈、睏倦，在未確定它們對您有何影響之前，請勿開車或操作危險機械。
2. 有心臟病、青光眼、攝護腺腫大、排尿困難、癲癇病史、甲狀腺機能亢進，正在服用其他藥品者請先告知醫師。
3. 此類藥品不可與 MAOI， astomisole， cisapride 或 terfenadine 合用。
4. MAOI 停用 2 週以上才可使用 Paroxetine HCl， Sertraline HCl， Fluvoxamine maleate，停藥 5 週後才可使用 Fluoxetine HCl。

■ 此藥可能引起的副作用有那些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
噁心、神經質、焦慮、失眠、頭暈	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯絡；您的劑量可能需要調整，醫師也許會再開額外的藥物來治療焦慮和失眠；噁心的症狀在服藥數週後通常會消失。
頭痛、睏倦、虛弱、顫抖、頭暈、流汗、注意力降低、激動、嘔吐、腹瀉或便秘、沒胃口、消化不良、肚子痛、漲氣	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯絡。
紅疹、蕁麻疹、皮膚癢、發燒、出現感冒症狀、抽筋	停藥並立即與醫師聯絡

以上資訊並無法代表該藥品的全部資訊，如您有任何疑問請向

醫師或藥師詢問，我們將竭誠為您服務

諮詢專線：07-5817121 轉 2002 或 5887104